

肺癌 CBDCA+PEM+BEV(202111~)

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー) ① ルートキープ 生理食塩液注 100mL	1 瓶		時間未定
	2	DIV 点滴静注(サーフロー) ② 30 分で 生理食塩液注 100mL ブライメド点滴静注用150mg	1 瓶 1 瓶		時間未定
	3	DIV 点滴静注(サーフロー) ③ 30 分で バックグラセロン点滴静注 3mg/100mL(カイトル) ★オルガトロン注 3.8mg/1mL	1 袋 2 A		時間未定
	4	DIV 点滴静注(サーフロー) ④ 10 分で 生理食塩液注 100mL ★500mg アリムタ注	1 瓶 500 mg /m <sup>2</sup>		時間未定
	5	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑤ 10 分で 生理食塩液注 50mL	1 瓶		時間未定
	6	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑥ 60 分で 5%ブドウ糖注 250mL(袋)(10/26~) 後)★50mg/5mL カボフラチン注	1 袋 6 mg /GFR+25		時間未定
	7	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑦ アバスチン前後、50mLでフラッシュ 生理食塩液注 100mL	1 瓶		時間未定
	8	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑧ 全量で 100 ml となるように調製 初回90分、2回目60分、3回目以降30分で 生理食塩液注 100mL ★100mg/4mL アバスチン注	1 瓶 15 mg /kg		時間未定
	処方				
	コメント				