

肺癌 CBDCA+PTX+BEV(202203~)

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー) ① ルートキープ 生理食塩液注 100mL	1 瓶		時間未定	
	2	DIV 点滴静注(サーフロー) ② 30 分で 生理食塩液注 100mL プロイメンド点滴静注用150mg	1 瓶 1 瓶		時間未定	
	3	DIV 点滴静注(サーフロー) ③ 15 分で 5% ブドウ糖注 100mL ホウラミン注 5mg/1mL ★オルカトロン注 3.8mg/1mL ファミシジブ注射液 20mg/2mL「トーワ」(カスター)	1 瓶 1 A 2 A 1 A		時間未定	
	4	DIV 点滴静注(サーフロー) ④ 30 分で パックケラニセトロン点滴静注 3mg/100mL(カイトリル)	1 袋		時間未定	
	5	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑤ 3 時間で フィルター必要 生理食塩液注 500mL ★30mg/5mL パックタキセル注(ホスピール)	1 袋 200 mg /m ²		時間未定	
	6	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑥ 60 分で 5%ブドウ糖注 250mL(袋)(10/26~) 後)★50mg/5mL カルボフラチン注	1 袋 6 mg /GFR+25		時間未定	
	7	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑦ アバスチン前後、50mLでフラッシュ 生理食塩液注 100mL	1 瓶		時間未定	
	8	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑧ 全量で 100 ml となるように調製 初回90分、2回目60分、3回目以降30分で 生理食塩液注 100mL ★100mg/4mL アバスチン注	1 瓶 15 mg /kg		時間未定	
	処方					
	コメント					