

肺癌 CBDCA+PTX+Pembrolizumab(202203~)

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー) ①③ ルートキープ、②後ルートフラッシュ 生理食塩液注 100mL	1 瓶		時間未定
	2	DIV 点滴静注(サーフロー) ② 30 分で フィルター必要 生理食塩液注 50mL	1 瓶		時間未定
		★キイトルーダ注 100mg/4mL	200 mg /Body		
	3	DIV 点滴静注(サーフロー) ④ 30 分で 生理食塩液注 100mL	1 瓶		時間未定
		プロイメンド点滴静注用150mg	1 瓶		
	4	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑤ 15 分で 5% ブドウ糖注 100mL	1 瓶		時間未定
		ホウライミン注 5mg/1mL	1 A		
		★オルカトロン注 3.8mg/1mL	2 A		
		ファミチング注射液 20mg/2mL「トロー」(カスター)	1 A		
	5	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑥ 30 分で パックカラニセロン点滴静注 3mg/100mL(カイトリル)	1 袋		時間未定
	6	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑦ 3 時間で フィルター必要 生理食塩液注 500mL	1 袋		時間未定
		★30mg/5mL パウタキセル注「ホスピール」	200 mg /m <sup>2</sup>		
	7	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑧ 60 分で 5%ブドウ糖注 250mL(袋)(10/26~)	1 袋		時間未定
		後)★50mg/5mL カルボフチン注	6 mg /GFR+25		
8	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑨ ルートフラッシュ 生理食塩液注 50mL	1 瓶		時間未定	
処方 コメント					