

肺癌 DTX+GEM(202203~)

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(8)
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	
		① 30 分で				
		5% ブドウ糖注 100mL	1 瓶			
		ホララミン注 5mg/1mL	1 A			
		★オルカトロン注 3.8mg/1mL	2 A			
		ファミチン注射液 20mg/2mL(トローワ(カスター))	1 A			
	2	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定
		② 30 分で				
		バックグラニセロン点滴静注 3mg/100mL(カイトリル)	1 袋			
	3	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定
		③ 60 分で				
		5%ブドウ糖注 250mL(袋)(10/26~)	1 袋			
		★20mg/1mLトセタキセル点滴静注(ニフロ)	60 mg /m <sup>2</sup>			
	4	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定
		④ 30 分で				
		5% ブドウ糖注 100mL	1 瓶			
	★ 200mg ジェムザール注	1000 mg /m <sup>2</sup>				
5	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定	
	⑤ フラッシュ					
	生理食塩液注 50mL	1 瓶				
6	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定	
	① 30 分で					
	5% ブドウ糖注 100mL	1 瓶				
	★オルカトロン注 3.8mg/1mL	1 A				
	プリンペラン注 10mg/2mL	1 A				
7	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定	
	② 30 分で					
	5% ブドウ糖注 100mL	1 瓶				
	★ 200mg ジェムザール注	1000 mg /m <sup>2</sup>				
8	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定	
	③ フラッシュ					
	生理食塩液注 50mL	1 瓶				
処方 コメント						