

肺癌 GEM+VNR

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(8)
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	
		① 30 分で				
		5% ブドウ糖注 100mL	1 瓶			
		★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1ml	1 A			
		プリンペラン注 10mg/2ml	1 A			
	2	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	
		② 5分以内で滴下				
		生理食塩液注 50mL	1 瓶			
		後)★ロゼウス注 40mg/4mL(ナベルピソ)	25 mg /m ²			
	3	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	
		③ フラッシュ				
		生理食塩液注 50mL	1 瓶			
	4	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	
		④ 30 分で				
	5% ブドウ糖注 100mL	1 瓶				
	★ 200mg ジェムザール注	1000 mg /m ²				
5	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
	⑤ フラッシュ					
	生理食塩液注 50mL	1 瓶				
6	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
	① 30 分で					
	5% ブドウ糖注 100mL	1 瓶				
	★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1ml	1 A				
	プリンペラン注 10mg/2ml	1 A				
7	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
	② 5分以内で滴下					
	生理食塩液注 50mL	1 瓶				
	後)★ロゼウス注 40mg/4mL(ナベルピソ)	25 mg /m ²				
8	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
	③ フラッシュ					
	生理食塩液注 50mL	1 瓶				
9	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
	④ 30 分で					
	5% ブドウ糖注 100mL	1 瓶				
	★ 200mg ジェムザール注	1000 mg /m ²				
10	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
	⑤ フラッシュ					
	生理食塩液注 50mL	1 瓶				
処方						
コメント						