

肺癌 Nivolumab+CBDCA+GEM(202111~)

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(8)	
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー) ①ルートキープ ②オプジーボ後フラッシュ 生理食塩液注 100mL	1 瓶		時間未定		
	2	DIV 点滴静注(サーフロー) ② 生理食塩液注 100mL ★240mg/24mL オプジーボ注	360 mg /Body 1 瓶		時間未定		
	3	DIV 点滴静注(サーフロー) ④ 30 分で 生理食塩液注 100mL プロイメンド点滴静注用150mg	1 瓶 1 瓶		時間未定		
	4	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑤ 30 分で ★オルカトロン注 3.8mg/1mL パックアラニセロン点滴静注 3mg/100mL(カイトリル)	2 A 1 袋		時間未定		
	5	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑥ 30 分で 5% ブドウ糖注 100mL ★ 200mg ジェムザール注	1 瓶 1000 mg /m <sup>2</sup>		時間未定		
	6	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑦ 60 分で 5%ブドウ糖注 250mL(袋)(10/26~) 後)★50mg/5mL カルボフランチ注	1 袋 5 mg /GFR+25		時間未定		
	7	DIV 点滴静注(サーフロー) ① 30 分で 5% ブドウ糖注 100mL ★オルカトロン注 3.8mg/1mL	1 瓶 1 A		時間未定		
	8	DIV 点滴静注(サーフロー) ② 30 分で 5% ブドウ糖注 100mL ★ 200mg ジェムザール注	1 瓶 1000 mg /m <sup>2</sup>		時間未定		
	9	DIV 点滴静注(サーフロー) ③ フラッシュ 生理食塩液注 50mL	1 瓶		時間未定		
	処方						
	コメント						