

肺癌 Nivolumab+CBDCA+PEM(202111~)

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー) ①ルートキープ ③オプジーボ後フラッシュ 生理食塩液注 100mL	1 瓶		時間未定
	2	DIV 点滴静注(サーフロー) ② 30 分で フィルター必要 生理食塩液注 100mL	1 瓶		時間未定
		★240mg/24mL オプジーボ注	360 mg /Body		
	3	DIV 点滴静注(サーフロー) ④ 30 分で 生理食塩液注 100mL	1 瓶		時間未定
		プロイメンド点滴静注用150mg	1 瓶		
	4	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑤ 30 分で パッケタゲラニセトロン点滴静注 3mg/100mL(カイトリル)	1 袋		時間未定
		★オルカトロ注 3.8mg/1mL	2 A		
	5	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑥ 10 分で 生理食塩液注 100mL	1 瓶		時間未定
		★100mg アリムタ注	500 mg /m ²		
	6	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑦ 10 分で 生理食塩液注 50mL	1 瓶		時間未定
	7	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑧ 60 分で 5%ブドウ糖注 250mL(袋)(10/26~)	1 袋		時間未定
		後)★50mg/5mL カルボウラチ注	6 mg /GFR+25		
	8	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑨ ルートフラッシュ 生理食塩液注 50mL	1 瓶		時間未定
	処方				
コメント					