

肺癌 Nivolumab+Ipilimumab+CBDCa+PTX(202203~)

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー) ①②ルートをキープ ③後フラッシュ 生理食塩液注 100mL	1 瓶		時間未定	
	2	DIV 点滴静注(サーフロー) ③ 30 分で 生理食塩液注 100mL プロイメド点滴静注用150mg	1 瓶 1 瓶		時間未定	
	3	DIV 点滴静注(サーフロー) ④ 30 分で パツクアラニセロン点滴静注 3mg/100mL(カトリル) ホウライ注 5mg/1mL ★オルカトロン注 3.8mg/1mL ファミシジ注射液 20mg/2mL(トワ)(カスター)	1 袋 1 A 2 A 1 A		時間未定	
	4	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑤⑥ オブジーボの前後でフラッシュ 生理食塩液注 50mL	1 瓶		時間未定	
	5	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑦ 30 分で フィルター必要 生理食塩液注 100mL ★240mg/24mL オプジーボ注	1 瓶 360 mg /Body		時間未定	
	6	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑧⑨ヤーボイ前後フラッシュ 生理食塩液注 50mL	1 瓶		時間未定	
注射	7	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑩ オブジーボと別ルート 30 分で フィルター必要 生理食塩液注 50mL 要時★50mg/10mL ヤーボイ点滴静注液 濃度1-4mg/mL	25 ml 1 mg /kg		時間未定	
	8	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑪ 3 時間で フィルター必要 生理食塩液注 500mL ★30mg/5mL ハウタキセル注(ホスピーラ)	1 袋 200 mg /m ²		時間未定	
	9	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑫ 500mg糖注 250mL(袋)(10/26~) 後★50mg/5mL カネフワジ注	1 袋 6 mg /GFR+25		時間未定	
	10	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑬ ルートフラッシュ 生理食塩液注 50mL	1 瓶		時間未定	
	11	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑭⑮ルートをキープ ⑯後でフラッシュ 生理食塩液注 100mL	1 瓶		時間未定	
	12	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑰ 30 分で 生理食塩液注 100mL プロイメド点滴静注用150mg	1 瓶 1 瓶		時間未定	
注射	13	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑱ 30 分で パツクアラニセロン点滴静注 3mg/100mL(カトリル) ホウライ注 5mg/1mL ★オルカトロン注 3.8mg/1mL ファミシジ注射液 20mg/2mL(トワ)(カスター)	1 袋 1 A 2 A 1 A		時間未定	
	14	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑲⑳ オブジーボの前後でフラッシュ 生理食塩液注 50mL	1 瓶		時間未定	
	15	DIV 点滴静注(サーフロー) ㉑ 30 分で フィルター必要 生理食塩液注 100mL ★240mg/24mL オプジーボ注	1 瓶 360 mg /Body		時間未定	
	16	DIV 点滴静注(サーフロー) ㉒ 3 時間で フィルター必要 生理食塩液注 500mL ★30mg/5mL ハウタキセル注(ホスピーラ)	1 袋 200 mg /m ²		時間未定	
	17	DIV 点滴静注(サーフロー) ㉓ 1 時間で 500mg糖注 250mL(袋)(10/26~) 後★50mg/5mL カネフワジ注	1 袋 6 mg /GFR+25		時間未定	
	18	DIV 点滴静注(サーフロー) ㉔ ルートフラッシュ 生理食塩液注 50mL	1 瓶		時間未定	
処方						
コメント						