

肺癌 Nivolumab+Ipilimumab+CDDP+PEM(202112~)

分類	QpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(22)
注射	1	① DIV 点滴静注(サーフロー) ① ルートキープ 生理食塩液注 100mL	1 瓶		時間未定	
	2	② DIV 点滴静注(サーフロー) ② 30 分で 生理食塩液注 100mL プロインド点静注用150me	1 瓶 1 瓶		時間未定	
	3	③ DIV 点滴静注(サーフロー) ③ 15 分で パロ/ピロノ点滴静注バッグ 0.75mg/50mL(対称) ★オムカト注 3.8mg/1mL	1 袋 3 A		時間未定	
	4	④ DIV 点滴静注(サーフロー) ④① ルートキープ オプジーボの前夜でフラッシュ 生理食塩液注 50mL	1 瓶		時間未定	
	5	⑤ DIV 点滴静注(サーフロー) ⑤ 30 分で フィルター必要 生理食塩液注 100mL ★240mg/24mL オプジーボ注	1 瓶 360 mg /Body		時間未定	
	6	⑥ DIV 点滴静注(サーフロー) ⑥② ヤーボイ前後フラッシュ 生理食塩液注 50mL	1 瓶		時間未定	
	7	⑦ DIV 点滴静注(サーフロー) ⑦ オプジーボと別ルート 30 分で フィルター必要 生理食塩液注 50mL 薬時★50mg/10mL ヤーボイ点滴静注液 濃度1~4mg/mL	25 ml 1 mg /kg		時間未定	
注射	8	⑧ DIV 点滴静注(サーフロー) ⑧ 10 分で 生理食塩液注 100mL ★100mg アム注	1 瓶 500 mg /m <sup>2</sup>		時間未定	
	9	⑨ DIV 点滴静注(サーフロー) ⑨ 60 分で フルテム1輸液 500mL 硫酸Me補正液1mEq/mL 20mL ★KCL注10mEqキリル注 10mL	1 袋 0.4 A 1 筒		時間未定	
	10	⑩ DIV 点滴静注(サーフロー) ⑩ 30 分で アニコールS注射液 300mL	1 瓶		時間未定	
	11	⑪ DIV 点滴静注(サーフロー) ⑪ 全量で500mLになるように調整 60 分で 生理食塩液注 500mL ★10mg/20mL シスプラチン注 75mg	1 袋 75 mg /m <sup>2</sup>		時間未定	
	12	⑫ DIV 点滴静注(サーフロー) ⑫ フルテム1輸液 500mL ★KCL注10mEqキリル注 10mL	1 袋 1 筒		時間未定	
注射	13	⑬ DIV 点滴静注(サーフロー) ⑬ ルートキープ 生理食塩液注 100mL	1 瓶		時間未定	
	14	⑭ DIV 点滴静注(サーフロー) ⑭ 30 分で 生理食塩液注 100mL プロインド点静注用150mg	1 瓶 1 瓶		時間未定	
	15	⑮ DIV 点滴静注(サーフロー) ⑮ 15 分で パロ/ピロノ点滴静注バッグ 0.75mg/50mL(対称) ★オムカト注 3.8mg/1mL	1 袋 3 A		時間未定	
	16	⑯ DIV 点滴静注(サーフロー) ⑯① ルートキープ オプジーボの前夜でフラッシュ 生理食塩液注 50mL	1 瓶		時間未定	
	17	⑰ DIV 点滴静注(サーフロー) ⑰ 30 分で フィルター必要 生理食塩液注 100mL ★240mg/24mL オプジーボ注	1 瓶 360 mg /Body		時間未定	
	18	⑱ DIV 点滴静注(サーフロー) ⑱ 10 分で 生理食塩液注 100mL ★100mg アム注	1 瓶 500 mg /m <sup>2</sup>		時間未定	
	19	⑲ DIV 点滴静注(サーフロー) ⑲ 60 分で フルテム1輸液 500mL 硫酸Me補正液1mEq/mL 20mL ★KCL注10mEqキリル注 10mL	1 袋 0.4 A 1 筒		時間未定	
処方 以外	20	⑳ DIV 点滴静注(サーフロー) ⑳ 30 分で アニコールS注射液 300mL	1 瓶		時間未定	
	21	㉑ DIV 点滴静注(サーフロー) ㉑ 全量で500mLになるように調整 60 分で 生理食塩液注 500mL ★10mg/20mL シスプラチン注 75mg	1 袋 75 mg /m <sup>2</sup>		時間未定	
	22	㉒ DIV 点滴静注(サーフロー) ㉒ 60 分で フルテム1輸液 500mL ★KCL注10mEqキリル注 10mL	1 袋 1 筒		時間未定	