

## 肺癌 PTX+GEM(202203~)

分類	GpNo.	薬剤／手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(8)
	1	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	
		① 30 分で				
		5% ブドウ糖注 100mL	1 瓶			
		★オルカトロン注 3.8mg/1mL	2 A			
		ファモチジン注射液 20mg/2mL「トーワ」(ガスター)	1 A			
		ホラミン注 5mg/1mL	1 A			
	2	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	
		② 30 分で				
		パック)ケラニセトロン点滴静注 3mg/100mL(カイトリル)	1 袋			
	3	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	
注射		③ 3 時間で フィルター必要				
		生理食塩液注 500mL	1 袋			
		★30mg/5mL ハカリキセル注「ホスピーラ」	200 mg /m <sup>2</sup>			
	4	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	
		④ 30 分で				
		5% ブドウ糖注 100mL	1 瓶			
		★ 200mg ジュムザール注	1000 mg /m <sup>2</sup>			
	5	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	
		⑤ フラッシュ				
		生理食塩液注 50mL	1 瓶			
	6	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	
		① 30 分で				
		5% ブドウ糖注 100mL	1 瓶			
		★オルカトロン注 3.8mg/1mL	1 A			
		プリンペラン注 10mg/2mL	1 A			
	7	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	
		② 30 分で				
		5% ブドウ糖注 100mL	1 瓶			
		★ 200mg ジュムザール注	1000 mg /m <sup>2</sup>			
	8	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	
		③ フラッシュ				
		生理食塩液注 50mL	1 瓶			
処方 コメント						