外科・消化器外科　胃癌　Herceptin+XP(初回)(2023／4～)

| 分類 | GpNo. | 薬剤／手技 | 投与量 | 点滴時間・速度 | day(1) | day(2) | day(3) | day(4) | day(5) | day(6) | day(7) | day(8) | day(9) | day(10) | day(11) | day(12) | day(13) | day(14) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注射 | 1 | DIV 点滴静注(サーフロー) | | | 時間未定 | | | | | | | | | | | | | |
| | | ①<br>ルートキープ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 生理食塩液注 50mL | 1 瓶 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | DIV 点滴静注(サーフロー) | | | 時間未定 | | | | | | | | | | | | | |
| | | ②<br>90 分で | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 生理食塩液注 250mL | 1 袋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ★60mg トラスツズマブBS点滴静注用 | 8 mg /kg | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 注射用蒸留水 100mL | 1 瓶 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (溶解用) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | DIV 点滴静注(サーフロー) | | | 時間未定 | | | | | | | | | | | | | |
| | | ③<br>30 分で | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | パロノセトロン点滴静注バッグ<br>0.75mg/50mL「タイホウ」 | 1 袋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | アロカリス点滴静注235mg/10mL | 1 V | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ★オルガトロン注 3.8mg/1mL | 3 A | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | DIV 点滴静注(サーフロー) | | | 時間未定 | | | | | | | | | | | | | |
| | | ④<br>全量で500mLになるように調整<br>120分で | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 生理食塩液注 500mL | 1 袋 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ★10mg/20mL シスプラチン注「マルコ」 | 80 mg /m² | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | DIV 点滴静注(サーフロー) | | | 時間未定 | | | | | | | | | | | | | |
| | | ⑤<br>全開で | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 生理食塩液注 50mL | 1 瓶 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 処方 | 1 | | | | ● | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ | ⟶ |
| | | 妊禁)★ゼローダ錠 300mg<br>夕より内服開始 | 2000 mg /m² | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 分2:朝夕食後約30分 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ｺﾒﾝﾄ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |