

外科・消化器外科（大腸癌）

Encorafenib+Binimetinib+Cet（初回）

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)	
注射	1	IVH 埋込型カテーテルによるIVH ① 30分で 生理食塩液注 100mL ★オルカトロン注 3.8mg/1mL ホララン注 5mg/1mL	1 瓶 2 A 1 A		時間未定							
	2	IVH 埋込型カテーテルによるIVH ② ④ アービタックスの前後で 生理食塩液注 50mL 後の生食はアービタックスと同じ速度で	1 瓶		時間未定							
	3	IVH 埋込型カテーテルによるIVH ③ 全量で500mLになるように調製 120分で 生理食塩液注 500mL 要時)★アービタックス注 100mg/20mL	1 袋 400 mg /m ²		時間未定							
	4	IVH 埋込型カテーテルによるIVH ポートフラッシュ用 処置)生食注シリンジ「NPJ」10mL	1 筒		時間未定							
	処方	1	要時)★効比錠 15mg 分2:朝夕食後約30分	90 mg /Body		●	→	→	→	→	→	→
		2	要時)★75mg ピラジビカ [®] セル 要時)★50mg ピラジビカ [®] セル 分1:朝食後約30分	300 mg /Body 300 mg /Body		●	→	→	→	→	→	→
		コメント										