外科・消化器外科　大腸癌　３週毎IRIS+Bev(2021／12～)

分類	GpNo	薬剤／手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)	day(8)	day(9)	day(10)	day(11)	day(12)	day(13)	day(14)
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定													
		① 30 分で																
		ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 0.75mg/50mL[ﾀｲﾎｳ]	1 袋															
		★ｵﾙｶﾞﾄﾛﾝ注 3.8mg/1mL	2 A															
		ﾌﾞｽｺﾊﾟﾝ注 20mg/1mL	1 A															
	2	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定													
		② 全量で100mLになるように調整 初回90分　2回目60分　3回目30分																
		生理食塩液注 100mL	1 瓶															
		★100mg/4mL アバスチン注	7.5 mg /kg															
	3	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定													
		③ ⑤ イリノテカンの前後でフラッシュ																
		生理食塩液注 100mL	1 瓶															
	4	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定													
		④ 90 分で																
		ｿﾙﾃﾞﾑ3A輸液 500mL	1 袋															
		★40mg/2mL イリノテカン注[ホスピーラ]	150 mg /m²															
処方	1				●	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶
		妊禁)★T25 ｴｽﾜﾝﾀｲﾎｳ配合OD錠	4 錠 /m²															
		妊禁)★T20 ｴｽﾜﾝﾀｲﾎｳ配合OD錠	4 錠 /m²															
		分2:朝夕食後約30分																
ｺﾒﾝﾄ																		