外科・消化器外科(大腸癌) FOLFIRI+Bev5mg

分類	GpNα	薬剤/手技	投与量	点滴時間·速度	day(1)
	ø.				
	1	IVH 埋込型力テーテルによるIVH			時間未定
		の 30 分で			
		ハプロノセトロン点:滴請約主ハシック。 0.75mg/50mL「タイホウ」	1袋		
		★オルカトロン注 3.8mg/1mL	2 A		
		ブスコパン注 20mg/1ml	1 A		
	2	IVH 埋込型力テーテルによるIVH			時間未定
		① 前投薬と同時に開始 側管から 120分で			
		5%7斗ウ糖注 250mL(袋)(10/26~)	1袋		
		★25mg レポホリナート注	200 mg /m²		
	3	IVH 埋込型力テーテルによるIVH			時間未定
注射		② 90 分で			
		ソルデム3A輸液 500mL	1袋		
		★40mg/2mL イリノテカン/主「NK」	150 mg /m²		
	4	IVH 埋込型力テーテルによるIVH			時間未定
		③ 15 分で メインボーラス投与			
		5% ブドウ糖注 50mL	1瓶		
		★1000mg/20mL 5-FU注	400 mg /m²		
	5	IVH 埋込型力テーテルによるIVH			時間未定
		④⑤ アバスチンの前後で			
		生理食塩液注 50mL	1瓶		
	6	IVH 埋込型力テーテルによるIVH			時間未定
		⑤ 全量で100mllになるように調整 初回90分 2回目60分 3回目以降30分			
		生理食塩液注 100mL	1瓶		
		★100mg/4mL アバスチン注	5 mg/kg		
	7	IVH 埋込型力テーテルによるIVH			時間未定
		Ø トレフューザポンプ合計140ml 46時間で			
		生理食塩液注 250mL	1袋		
		★1000mg/20mL 5-FU注	2400 mg /m²		

外科・消化器外科(大腸癌) FOLFIRI+Bev5mg

分類	GpNα	薬剤/手技	投与量	点瀋時間·速度	day(1)
	8	IVH 埋込型カテーテルによるIVH	-		時間未定
		® ポートフラッシュ用			
		処置)生食注シリンシ「NP」10mL	1 筒		
	9	IVH 埋込型力テーテルによるIVH			時間未定
		③ ポートフラッシュ用			
		処置)生食注シリンジ「NP」10mL	1 筒		
処方					
14XE					