

外科・消化器外科（胆道癌）

G E M b i w e e k l y

分類	GpNo.	薬剤／手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(15)
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	
		① 30 分で				
		後・パック・クラニセトロン点滴静注 3mg/100mL(カイドリ)	1袋			
		★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1ml	2 A			
	2	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	
		② 30 分で				
		5% ブドウ糖注 100mL	1 瓶			
		★ 200mg ジュムザール注	1000 mg /m ²			
	3	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	
		③ 全開で				
処方 コメント		生理食塩液注 50mL	1 瓶			
	4	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	
		① 30 分で				
		後・パック・クラニセトロン点滴静注 3mg/100mL(カイドリ)	1袋			
		★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1ml	2 A			
	5	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	
		② 30 分で				
		5% ブドウ糖注 100mL	1 瓶			
		★ 200mg ジュムザール注	1000 mg /m ²			
	6	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	
		③ 全開で				
		生理食塩液注 50mL	1 瓶			