

乳腺外科 Pembrolizumab+PTX+CBDCA

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(8)	day(15)
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー) ①③④ ルートキープ、②⑦後ルートフラッシュ 生理食塩液注 100mL	1 瓶		時間未定		
	2	DIV 点滴静注(サーフロー) ② 30 分で フィルター必要 生理食塩液注 50mL ★キイトルーダ注 100mg/4mL	1 瓶 200 mg /Body		時間未定		
	3	DIV 点滴静注(サーフロー) ④ 15 分で 生理食塩液注 100mL ★オルカトロン注 3.8mg/1mL ファミチン注射液 20mg/2mL(トローワ)(カスター) ホララミン注 5mg/1mL	1 瓶 2 A 1 A 1 A		時間未定		
	4	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑤ 30 分で パロ/セトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL(タイボウ) アロカス点滴静注285mg/10mL	1 袋 1 V		時間未定		
	5	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑥ 60 分で フィルター必要 5%ブドウ糖注 250mL(袋)(10/26~) ★30mg/5mL ハウタキセル注(ホスピール)	1 袋 80 mg /m <sup>2</sup>		時間未定		
	6	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑦ 60 分で 5%ブドウ糖注 250mL(袋)(10/26~) 後★50mg/5mL カルボフラチン注	1 袋 5 mg /GFR+25		時間未定		
	7	DIV 点滴静注(サーフロー) ① 15 分で 生理食塩液注 100mL ★オルカトロン注 3.8mg/1mL ファミチン注射液 20mg/2mL(トローワ)(カスター) ホララミン注 5mg/1mL	1 瓶 1 A 1 A 1 A		時間未定	時間未定	
	8	DIV 点滴静注(サーフロー) ② 30 分で バッグクラニセトロン点滴静注 3mg/100mL(カイトリル)	1 袋		時間未定	時間未定	
	9	DIV 点滴静注(サーフロー) ③ 60 分で フィルター必要 5%ブドウ糖注 250mL(袋)(10/26~) ★30mg/5mL ハウタキセル注(ホスピール)	1 袋 80 mg /m <sup>2</sup>		時間未定	時間未定	
	10	DIV 点滴静注(サーフロー) ④ 全開で 生理食塩液注 50mL	1 瓶		時間未定	時間未定	
処方 コメント							