

乳癌

PTX+パージェタ+ハーセプチン（2回目以降）（2022/3～）

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(8)	day(15)
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
		① 15 分で 生理食塩液注 100mL ★オルカトロン注 3.8mg/1mL ファミチン注射液 20mg/2mL(トローワ)(カスター) ホウラミン注 5mg/1mL	1 瓶 2 A 1 A 1 A				
	2	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
		② 30 分で バックグラニセロン点滴静注 3mg/100mL(カイトリル)	1 袋				
	3	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
		③ ⑤ ⑦ パージェタ、トラスツズマブの前後フラ 生理食塩液注 100mL	1 瓶				
	4	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
		④ 忍容性良好なら30分で 生理食塩液注 250mL ★パージェタ注 420mg/14mL	1 袋 420 mg /Body				
	5	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
		⑤ 忍容性良好なら30分で 生理食塩液注 250mL ★60mg トラスツズマブBS点滴静注用 注射用蒸留水 100mL (溶解用)	1 袋 6 mg /kg 1 瓶				
	6	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
		⑥ 60 分で フィルター必要 5%ブドウ糖注 250mL(袋)(10/26～) ★30mg/5mL パウリタセル注(ホスピーラ)	1 袋 80 mg /m ²				
	7	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
		⑧ 全開で 生理食塩液注 50mL	1 瓶				
	8	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
		① 15 分で 生理食塩液注 100mL ★オルカトロン注 3.8mg/1mL ファミチン注射液 20mg/2mL(トローワ)(カスター) ホウラミン注 5mg/1mL	1 瓶 2 A 1 A 1 A				

注射	9	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定
		② 30 分で				
		バックグラニセトロン点滴静注 3mg/100mL(カイトリル)	1 袋			
	10	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定
		③ 60 分で フィルター必要				
		5%ブドウ糖注 250mL(袋)(10/26~)	1 袋			
		★30mg/5mL ハウリタキセル注(ホスピール)	80 mg /m ²			
	11	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定
		④ 全開で				
		生理食塩液注 50mL	1 瓶			
	12	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定
		① 15 分で				
		生理食塩液注 100mL	1 瓶			
		★オルカトロン注 3.8mg/1mL	2 A			
		ファミジン注射液 20mg/2mL(トローワ)(カスター)	1 A			
	ホウラミン注 5mg/1mL	1 A				
13	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定	
	② 30 分で					
	バックグラニセトロン点滴静注 3mg/100mL(カイトリル)	1 袋				
14	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定	
	③ 60 分で フィルター必要					
	5%ブドウ糖注 250mL(袋)(10/26~)	1 袋				
	★30mg/5mL ハウリタキセル注(ホスピール)	80 mg /m ²				
15	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定	
	④ 全開で					
	生理食塩液注 50mL	1 瓶				
処方						
コメント						