

乳癌

PTX+ハーセプチン（初回）改訂版(2022/3～)

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(8)	day(15)	day(22)
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定			
		① 15 分で 生理食塩液注 100mL ★オルカトロン注 3.8mg/1mL ファモチジン注射液 20mg/2mL[トロー] (カスター) ホパラミン注 5mg/1mL	1 瓶 2 A 1 A 1 A					
	2	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定			
		② 30 分で パックタラニセトロン点滴静注 3mg/100mL(カイトリル)	1 袋					
	3	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定			
		③ 60 分で フィルター必要 5%ブドウ糖注 250mL(袋)(10/26～) ★30mg/5mL パクリタキセル注[ホスピール]	1 袋 80 mg /m ²					
	4	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定			
		④ トラスツスマブの前線で 生理食塩液注 100mL	1 瓶					
	5	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定			
		⑤ 90 分で 生理食塩液注 250mL ★60mg トラスツスマブ [®] BS点滴静注用 初回は4mg/kg 注射用蒸留水 100mL (溶解用)	1 袋 4 mg /kg 1 瓶					
	6	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定			
		① 30 分で パックタラニセトロン点滴静注 3mg/100mL(カイトリル) ★オルカトロン注 3.8mg/1mL ファモチジン注射液 20mg/2mL[トロー] (カスター) ホパラミン注 5mg/1mL	1 袋 2 A 1 A 1 A					
	7	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定			
		② 忍容性良好なら30分で 生理食塩液注 250mL ★60mg トラスツスマブ [®] BS点滴静注用 注射用蒸留水 100mL (溶解用)	1 袋 2 mg /kg 1 瓶					
	8	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定			
		③ パクリタキセルの前線で 生理食塩液注 100mL	1 瓶					
	9	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定			
		④ 60 分で フィルター必要 5%ブドウ糖注 250mL(袋)(10/26～) ★30mg/5mL パクリタキセル注[ホスピール]	1 袋 80 mg /m ²					

注射	10	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定
		① 30 分で				
		パックウラニセトロン点滴静注 3mg/100mL(カイトリル)	1 袋			
		★オルカトロン注 3.8mg/1mL	2 A			
		ファミチン注射液 20mg/2mL(トーワ)(カスター)	1 A			
	ホララミン注 5mg/1mL	1 A				
	11	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定
		② 忍容性良好なら30分で				
		生理食塩液注 250mL	1 袋			
		★60mg トラスツスマフ [®] BS点滴静注用	2 mg /kg			
		注射用蒸留水 100mL (溶解用)	1 瓶			
	12	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定
		③ パクリタキセルの前後で				
		生理食塩液注 100mL	1 瓶			
	13	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定
		④ 60 分で フィルター必要				
		5%ブドウ糖注 250mL(袋)(10/26~)	1 袋			
		★30mg/5mL パクリタキセル注ホスピール	80 mg /m ²			
	14	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定
		① ルートキープ残りはフラッシュ用				
		生理食塩液注 100mL	1 瓶			
	15	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定
		② 忍容性良好なら30分で				
		生理食塩液注 250mL	1 袋			
		★60mg トラスツスマフ [®] BS点滴静注用	2 mg /kg			
		注射用蒸留水 100mL (溶解用)	1 瓶			
処方						
コメント						