乳腺外科　PTX＋ハーセプチン改訂版（2回目以降)(2022／3～)

分類	GpNo.	薬剤／手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(8)	day(15)	day(22)
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定			
		① 30 分で						
		ﾊﾟｯｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注 3mg/100mL(ｶｲﾄﾘﾙ)	1 袋					
		★ｵﾙｶﾞﾄﾛﾝ注 3.8mg/1mL	2 A					
		ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ注射液 20mg/2mL｢ﾄｰﾜ｣(ｶﾞｽﾀｰ)	1 A					
		ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注 5mg/1mL	1 A					
	2	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定			
		② 忍容性良好なら30分で						
		生理食塩液注 250mL	1 袋					
		★60mg ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞBS点滴静注用	2 mg /kg					
		注射用蒸留水 100mL	1 瓶					
		(溶解用)						
	3	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定			
		③ パクリタキセル前後フラッシュ						
		生理食塩液注 100mL	1 瓶					
	4	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定			
		④ 60 分で フィルター必要						
		5%ﾌﾞﾄﾞｳ糖注 250mL(袋)(10/26～)	1 袋					
		★30mg/5mL ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ注｢ﾎｽﾋﾟｰﾗ｣	80 mg /m²					
	5	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定		
		① 30 分で						
		ﾊﾟｯｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注 3mg/100mL(ｶｲﾄﾘﾙ)	1 袋					
		★ｵﾙｶﾞﾄﾛﾝ注 3.8mg/1mL	2 A					
		ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ注射液 20mg/2mL｢ﾄｰﾜ｣(ｶﾞｽﾀｰ)	1 A					
		ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注 5mg/1mL	1 A					
	6	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定		
		② 忍容性良好なら30分で						
		生理食塩液注 250mL	1 袋					
		★60mg ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞBS点滴静注用	2 mg /kg					
		注射用蒸留水 100mL	1 瓶					
		(溶解用)						
	7	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定		
		③ パクリタキセル前後フラッシュ						
		生理食塩液注 100mL	1 瓶					
	8	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定		
		④ 60 分で フィルター必要						
		5%ﾌﾞﾄﾞｳ糖注 250mL(袋)(10/26～)	1 袋					
		★30mg/5mL ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ注｢ﾎｽﾋﾟｰﾗ｣	80 mg /m²					
	9	DIV 点滴静注(サーフロー)					時間未定	
		① 30 分で						
		ﾊﾟｯｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注 3mg/100mL(ｶｲﾄﾘﾙ)	1 袋					
		★ｵﾙｶﾞﾄﾛﾝ注 3.8mg/1mL	2 A					
		ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ注射液 20mg/2mL｢ﾄｰﾜ｣(ｶﾞｽﾀｰ)	1 A					
		ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ注 5mg/1mL	1 A					
	10	DIV 点滴静注(サーフロー)					時間未定	
		② 忍容性良好なら30分で						
		生理食塩液注 250mL	1 袋					
		★60mg ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞBS点滴静注用	2 mg /kg					
		注射用蒸留水 100mL	1 瓶					
		(溶解用)						
	11	DIV 点滴静注(サーフロー)					時間未定	
		③ パクリタキセル前後フラッシュ						
		生理食塩液注 100mL	1 瓶					
	12	DIV 点滴静注(サーフロー)					時間未定	
		③ 60 分で フィルター必要						
		5%ﾌﾞﾄﾞｳ糖注 250mL(袋)(10/26～)	1 袋					
		★30mg/5mL ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ注｢ﾎｽﾋﾟｰﾗ｣	80 mg /m²					
	13	DIV 点滴静注(サーフロー)						時間未定
		① ルートキープ残りはフラッシュ用						
		生理食塩液注 100mL	1 瓶					
	14	DIV 点滴静注(サーフロー)						時間未定
		② 忍容性良好なら30分で						
		生理食塩液注 250mL	1 袋					
		★60mg ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞBS点滴静注用	2 mg /kg					
		注射用蒸留水 100mL	1 瓶					
		(溶解用)						
処方								
ｺﾒﾝﾄ								