

乳癌

テセントリク + アブラキサン

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(8)	day(15)
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー) ①③ ルートキープ、②後フラッシュ 生理食塩液注 100mL	1 瓶		時間未定		
	2	DIV 点滴静注(サーフロー) ② フィルター必要 初回60分、2回目以降は30分も可 生理食塩液注 250mL	1 袋		時間未定		
		要時)★840mg/14mL テセントリク注	840 mg /Body				
	3	DIV 点滴静注(サーフロー) ④ 30分で バックグラニセトロン点滴静注 3mg/100mL(カイトリル)	1 袋		時間未定		
		★オルガトロン注 3.8mg/1mL	2 A				
	4	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑤ フィルター禁忌 30分で 生理食塩液注 100mL	1 瓶		時間未定		
		★アブラキサノ注 100mg	100 mg /m ²				
	5	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑥ フラッシュ用 生理食塩液注 50mL	1 瓶		時間未定		
	6	DIV 点滴静注(サーフロー) ① 30分で バックグラニセトロン点滴静注 3mg/100mL(カイトリル)	1 袋		時間未定		
		★オルガトロン注 3.8mg/1mL	2 A				
注射	7	DIV 点滴静注(サーフロー) ② フィルター禁忌 30分で 生理食塩液注 100mL	1 瓶		時間未定		
		★アブラキサノ注 100mg	100 mg /m ²				
	8	DIV 点滴静注(サーフロー) ③ フラッシュ用 生理食塩液注 50mL	1 瓶		時間未定		
	9	DIV 点滴静注(サーフロー) ①③ ルートキープ、②後フラッシュ 生理食塩液注 100mL	1 瓶		時間未定		
	10	DIV 点滴静注(サーフロー) ② フィルター必要 初回60分、2回目以降は30分も可 生理食塩液注 250mL	1 袋		時間未定		
	要時)★840mg/14mL テセントリク注	840 mg /Body					

	11	DIV 点滴静注(サーフロー)					時間未定
		④ 30分で					
		パツクケラニセトロン点滴静注 3mg/100mL(カイトリル)	1 袋				
		★オルガトロン注 3.8mg/1mL	2 A				
	12	DIV 点滴静注(サーフロー)					時間未定
		⑤ フィルター禁忌 30分で					
		生理食塩液注 100mL	1 瓶				
		★アブラキサソ注 100mg	100 mg /m ²				
	13	DIV 点滴静注(サーフロー)					時間未定
		⑥ フラッシュ用					
		生理食塩液注 50mL	1 瓶				
処方							
コメント							