

乳癌 パーージェタ+ハーセプチン+ドセタキセル(2回目以降)(2021/11~)

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定
		① 15分で			
		パッケ)クラニセトロン点滴静注 3mg/100mL(カイトリル)	1袋		
		★オルカトロン注 3.8mg/1mL	2 A		
	2	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定
		② ④ ⑥ パーージェタ、ハーセプチンの前後フラッシュ			
		生理食塩液注 100mL	1瓶		
	3	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定
		③ 忍容性良好なら30分で			
		生理食塩液注 250mL	1袋		
		★パーージェタ注 420mg/14mL	420 mg /Body		
	4	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定
		⑤ 忍容性良好なら30分で			
		生理食塩液注 250mL	1袋		
		★60mg トラスツスマブBS点滴静注用	6 mg /kg		
		注射用蒸留水 100mL (溶解用)	1瓶		
	5	DIV 持続点滴			時間未定
		⑦ 60分で			
	5%ブドウ糖注 250mL(袋)(10/26~)	1袋			
	★20mg/1mLドセタキセル点滴静注「ニフコ」	75 mg /m <sup>2</sup>			
6	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	
	⑧ フラッシュ用				
	生理食塩液注 50mL	1瓶			
処方 コメント					