泌尿器科　GC　アロキシ　２８(2022／3～)

分類	GpNo.	薬剤／手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(8)	day(15)
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定					
		メイン① 30 分で								
		★オルガトロン注 3.8mg/1mL	1 A							
		生理食塩液注 100mL	1 瓶							
	2	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定					
		メイン② 30 分で								
		5% ブドウ糖注 100mL	1 瓶							
		★ 200mg ジェムザール注	1000 mg /m²							
	3	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定					
		フラッシュ用								
		生理食塩液注 50mL	1 瓶							
	4	DIV 点滴静注(サーフロー)				09:00				
		メイン① 4 時間で								
		生理食塩液(ﾌｿｰ) 1000mL(エアレスタイプ)	1 袋							
		ファモチジン注射液 20mg/2mL(トーワ)(ｶﾞｽﾀｰ)	1 A							
	5	DIV 点滴静注(サーフロー)				13:00				
		メイン② 3 時間で								
		生理食塩液注 500mL	1 袋							
	6	DIV 点滴静注(サーフロー)				16:00				
		メイン③ 4 時間で								
		生理食塩液(ﾌｿｰ) 1000mL(エアレスタイプ)	1 袋							
		プリンペラン注 10mg/2mL	1 A							
	7	DIV 点滴静注(サーフロー)				20:00				
		メイン④ 4 時間で								
		ソルデム3A輸液 500mL	1 袋							
	8	DIV 点滴静注(サーフロー)				12:00				
		側管① 30 分で								
		★オルガトロン注 3.8mg/1mL	2 A							
		パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL(ﾀｲﾎｳ)	1 袋							
	9	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定				
		側管② 1 時間以上かけて								
		マンニットールS注射液 300mL	1 瓶							
	10	DIV 点滴静注(サーフロー)				14:00				
		側管③ 150分で 全量で500mLになるように調製								
		生理食塩液注 500mL	1 袋							
		★10mg/20mL シスプラチン注(ﾏﾙｺ)	70 mg /m²							
	11	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定				
		側管④ 30 分で								
		生理食塩液注 100mL	1 瓶							
		ラシックス注 20mg/2mL	1 A							
	12	DIV 点滴静注(サーフロー)					09:00			
		メイン① 100ml／時								
		ヴィーンF輸液 500mL	1 袋							
		5時間で								
		ファモチジン注射液 20mg/2mL(トーワ)(ｶﾞｽﾀｰ)	1 A							
		★オルガトロン注 3.8mg/1mL	2 A							
	13	DIV 点滴静注(サーフロー)					14:00			
		メイン② 100ml／時								
		ヴィーンF輸液 500mL	1 袋							
		5時間で								
	14	DIV 点滴静注(サーフロー)						09:00		
		メイン① 100ml／時								
		ヴィーンF輸液 500mL	1 袋							
		5時間で								
		ファモチジン注射液 20mg/2mL(トーワ)(ｶﾞｽﾀｰ)	1 A							
		★オルガトロン注 3.8mg/1mL	2 A							
	15	DIV 点滴静注(サーフロー)						14:00		
		メイン② 100ml／時								
		ヴィーンF輸液 500mL	1 袋							
		5時間で								
	16	DIV 点滴静注(サーフロー)							時間未定	
		メイン① 30 分で								
		生理食塩液注 100mL	1 瓶							
		★オルガトロン注 3.8mg/1mL	1 A							
	17	DIV 点滴静注(サーフロー)							時間未定	
		メイン② 30 分で								
		5% ブドウ糖注 100mL	1 瓶							
		★ 200mg ジェムザール注	1000 mg /m²							
	18	DIV 点滴静注(サーフロー)							時間未定	
		フラッシュ用								
		生理食塩液注 50mL	1 瓶							
	19	DIV 点滴静注(サーフロー)								時間未定
		メイン① 30 分で								
		生理食塩液注 100mL	1 瓶							
		★オルガトロン注 3.8mg/1mL	1 A							
	20	DIV 点滴静注(サーフロー)								時間未定
		メイン② 30 分で								
		5% ブドウ糖注 100mL	1 瓶							
		★ 200mg ジェムザール注	1000 mg /m²							
	21	DIV 点滴静注(サーフロー)								時間未定
		フラッシュ用								
		生理食塩液注 50mL	1 瓶							
処方										
ｺﾒﾝﾄ										