

泌尿器科 GEM・DTX (60mg/m<sup>2</sup>) (2021/11～)

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(8)
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー) 30 分で ①			時間未定	
		バックグラセロン点滴静注 3mg/100mL(カイトリル)	1 袋			
		★オルガトロン注 3.8mg/1mL	1 A			
	2	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	
		30 分厳守 ②				
		5% ブドウ糖注 100mL	1 瓶			
		★ 200mg ジェムザール注	1000 mg /m <sup>2</sup>			
	3	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	
		フラッシュ用 生理食塩液注 50mL	1 瓶			
	4	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定
		30 分で ①				
		バックグラセロン点滴静注 3mg/100mL(カイトリル)	1 袋			
		★オルガトロン注 3.8mg/1mL	2 A			
	5	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定
	30 分厳守 ②					
	5% ブドウ糖注 100mL	1 瓶				
	★ 200mg ジェムザール注	1000 mg /m <sup>2</sup>				
6	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定	
	1 時間で ③					
	★20mg/1mL トセタキセル点滴静注「ニフコ」	60 mg /m <sup>2</sup>				
	5%ブドウ糖注 250mL(袋)(10/26～)	1 袋				
7	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定	
	フラッシュ用 生理食塩液注 50mL	1 瓶				
処方						
コメント						