

【抗インフルエンザ薬の治療フロー（成人の場合）】

監修 感染防止対策室 抗菌薬適正使用支援チーム（AST）
 2024.12作成 薬剤部 天野多詠、森良江、山崎貴之
 参照：添付文書、日本感染症学会HP

治療

非重症

内服薬

吸入薬

重症

注射薬

価格重視

タミフルCap75mg/タミフルDS

1回75mg 1日2回 5日間

Cap：2,058円/ DS：3,300円

※腎機能に応じて用量調整必要

Ccr>30： 1回75mg 1日2回

10<Ccr≤30：1回75mg 1日1回

Ccr≤10： 推奨しない

リレンザ5mg

1回10 mg(2^プ リスター) 1日2回 5日間 **2,412円**

【慎重投与】 喘息患者

ラピアクタ点滴静注300mg

300mg 15分以上かけて投与 **6,331円**

※重症例、重症化リスク高い場合

600mg 15分以上かけて連日投与

※腎機能に応じて用量調整必要

治療回数重視

ゾフルーザ錠20mg

80kg以上：80mg 単回 **9,755.2円**

80kg未満：40mg 単回 **4,877.6円**

【慎重投与】 重度肝機能障害

イナビル吸入用粉末20mg

1回40mg(2本) 単回 **4,359円**

【慎重投与】 喘息患者

腎機能	1回投与量	
	通常量	重症化リスク高い場合
Ccr ≥ 50	1回300mg	1回600mg
30 ≤ Ccr < 50	1回100mg	1回200mg
10 ≤ Ccr < 30	1回50mg	1回100mg
Ccr < 10	推奨しない	

※非重症例で内服・吸入困難例はラピアクタ点滴静注300mgを推奨

予防【自費診療】

内服薬

吸入薬

タミフルCap75mg/タミフルDS

1回75mg 1日1回 7～10日間

Cap：1,440.6～2,058円

DS：2,310～3,300円

※腎機能に応じて用量調整必要

Ccr>30： 1回75mg 1日1回

10<Ccr≤30：1回75mg 隔日

Ccr≤10： 推奨しない

ゾフルーザ錠20mg

80kg以上：1回80mg 単回 **9,755.2円**

80kg未満：1回40mg 単回 **4,877.6円**

リレンザ5mg

1回10 mg(2^プ リスター) 1日1回 10日間 **2,412円**

イナビル吸入用粉末20mg

1回40mg(2本) 単回 **4,359円**

もしくは

1回20mg(1本) 1日1回 2日間 **4,359円**

※金額は2024.12時点の薬価を基に総治療日数で試算