

採用薬品一覧（2025年3月更新）

| 採用区分 | 製品名 | 規格 |
|------|----------------------------|-------------------------|
| 院外専用 | 【般】アマンタジン塩酸塩細粒10% | 100mg/g |
| 院外専用 | 【般】オランザピン細粒1% | 10mg/g |
| 院外専用 | 【般】トリメプチンマレイン酸塩錠100mg | 100mg/錠 |
| 院外専用 | 【般】フェキソフェナジン塩酸塩DS5% | 15mg/包 |
| 院外専用 | 【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg | 30mg/錠 |
| 院外専用 | 【般】レボセチリジン塩酸塩DS0.5% | 5mg/g |
| 院外専用 | 【般】酸化マグネシウム細粒83% | 883mg/g |
| 院外専用 | S・M配合散 | 1.3g/包 |
| 院外専用 | アーチスト錠10mg | 10mg/錠 |
| 院外専用 | アーチスト錠2.5mg | 2.5mg/錠 |
| 院外専用 | アーリーダ錠60mg | 60mg/錠 |
| 院外専用 | アイベータ配合点眼液 | 5mL/本 |
| 院外専用 | アイミクス配合錠HD | 1錠 |
| 院外専用 | アイラミド配合懸濁性点眼液 | 5mL/本 |
| 院外専用 | アキネトン細粒1% | 10mg/g |
| 院外専用 | アクトス錠15 | 15mg/錠 |
| 院外専用 | アクトネル錠75mg | 75mg/錠 |
| 院外専用 | アサコール錠400mg | 400mg/錠 |
| 院外専用 | アシテアダニ舌下錠100単位(IR) | 100単位(IR)/錠 |
| 院外専用 | アシテアダニ舌下錠300単位(IR) | 300単位(IR)/錠 |
| 院外専用 | アシノン錠150mg | 150mg/錠 |
| 院外専用 | アズノールST錠口腔用5mg | 5mg/錠 |
| 院外専用 | アスバラカリウム散50% | 2.9mEq/g |
| 院外専用 | アスバラカリウム錠300mg | 1.8mEq/錠 |
| 院外専用 | アゼプチン錠1mg | 1mg/錠 |
| 院外専用 | アゾルガ配合懸濁性点眼液 | 5mL/本 |
| 院外専用 | アダプチノール錠5mg | 5mg/錠 |
| 院外専用 | アダラートCR錠20mg | 20mg/錠 |
| 院外専用 | アタラックス-Pシロップ0.5% | 5mg/mL（ヒドロキシジン塩酸塩として） |
| 院外専用 | アテキュラ吸入用カプセル高用量 | 1Cap |
| 院外専用 | アテキュラ吸入用カプセル中用量 | 1Cap |
| 院外専用 | アテディオ配合錠 | 1錠 |
| 院外専用 | アドエア125エアゾール120吸入用 | 120回噴霧/缶 |
| 院外専用 | アドエア250エアゾール120吸入用 | 120回噴霧/缶 |
| 院外専用 | アドエア250ディスカス60吸入用 | 60プリスター/キット |
| 院外専用 | アトーゼット配合錠HD | 1錠 |
| 院外専用 | アトーゼット配合錠LD | 1錠 |
| 院外専用 | アドナ錠30mg | 30mg/錠 |
| 院外専用 | アニュイティ100 μ gエリプタ30吸入用 | 100 μ g/吸入, 30吸入/本 |
| 院外専用 | アノーロエリプタ30吸入用 | 30吸入/キット |
| 院外専用 | アプレゾリン錠10mg | 10mg/錠 |
| 院外専用 | アポハイドローション20% | 4.5mL4.32g/本 |
| 院外専用 | アマリール0.5mg錠 | 0.5mg/錠 |
| 院外専用 | アマリール1mg錠 | 1mg/錠 |
| 院外専用 | アミティーザカプセル24 μ g | 24 μ g/Cap |
| 院外専用 | アムロジンOD錠5mg | 5mg/錠 |
| 院外専用 | アモバン錠10 | 10mg/錠 |
| 院外専用 | アラミスト点鼻液27.5 μ g120噴霧用 | 27.5 μ g120噴霧用10g/本 |
| 院外専用 | アラミスト点鼻液27.5 μ g56噴霧用 | 27.5 μ g56噴霧用6g/本 |
| 院外専用 | アリドネバッチ27.5mg | 27.5mg/枚 |
| 院外専用 | アリミデックス錠1mg | 1mg/錠 |
| 院外専用 | アルケラン錠2mg | 2mg/錠 |
| 院外専用 | アルサルミン細粒90% 1g/包 | 1g/包 |
| 院外専用 | アルサルミン内用液10% | 10mL/包 |
| 院外専用 | アルダクトンA錠25mg | 25mg/錠 |
| 院外専用 | アルファロールカプセル0.25 μ g | 0.25 μ g/Cap |
| 院外専用 | アルファロールカプセル1 μ g | 1 μ g/Cap |
| 院外専用 | アレグラ錠60mg | 60mg/錠 |

| | | |
|------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 院外専用 | アレジオン眼瞼クリーム0.5% | 2g/本 |
| 院外専用 | アレロックOD錠5mg | 5mg/錠 |
| 院外専用 | アロマシン錠25mg | 25mg/錠 |
| 院外専用 | アンテベートクリーム0.05% | 0.05%5g/本 |
| 院外専用 | アンテベートローション0.05% | 0.05%5g/本 |
| 院外専用 | アンテベート軟膏0.05% | 0.05%5g/本 |
| 院外専用 | アンヒバ坐剤小児用200mg | 200mg/個 |
| 院外専用 | イクスタンジ錠80mg | 80mg/錠 |
| 院外専用 | イソジンガーゲル液 | 7%30mL/本 |
| 院外専用 | イソバイドシロップ70% | 350g500mL/瓶 |
| 院外専用 | イソバイドシロップ70%分包20mL | 14.0g20mL/包 |
| 院外専用 | イソバイドシロップ70%分包30mL | 21.0g30mL/包 |
| 院外専用 | イソメニールカプセル7.5mg | 7.5mg/Cap |
| 院外専用 | イトリゾールカプセル50 | 50mg/Cap |
| 院外専用 | イニシンク配合錠 | 1錠 |
| 院外専用 | イノラス配合経腸用液(りんご) | 187.5mL/パウチ |
| 院外専用 | イフェクサーSRカプセル37.5mg | 37.5mg/Cap |
| 院外専用 | イフェクサーSRカプセル75mg | 75mg/Cap |
| 院外専用 | イブランス錠125mg | 125mg/錠 |
| 院外専用 | イブランス錠25mg | 25mg/錠 |
| 院外専用 | イリボーOD錠5 μ g | 5 μ g/錠 |
| 院外専用 | イルベタン錠100mg | 100mg/錠 |
| 院外専用 | インスリンアスパルトBS注ソロスターNR「サノフィ」 | 300単位3mL/キット |
| 院外専用 | インターール吸入液1% | 20mg2mL/管 |
| 院外専用 | インフリーカプセル100mg | 100mg/Cap |
| 院外専用 | ウェールナラ配合錠 | 1錠 |
| 院外専用 | ウルソ錠100mg | 100mg/錠 |
| 院外専用 | エイベリスミニ点眼液0.002% | 0.002%0.3mL/本 |
| 院外専用 | エイベリス点眼液0.002% | 0.002%2.5mL/本 |
| 院外専用 | エースコール錠2mg | 2mg/錠 |
| 院外専用 | エカード配合錠HD | 1錠 |
| 院外専用 | エクア錠50mg | 50mg/錠 |
| 院外専用 | エクメット配合錠HD | 1錠 |
| 院外専用 | エクメット配合錠LD | 1錠 |
| 院外専用 | エクラープラスター20 μ g/cm ² | 7.5cm×10cm/枚 |
| 院外専用 | エクリラ400 μ gジェヌエア30吸入用 | 30吸入/キット |
| 院外専用 | エクロックゲル5% | 40g/本 |
| 院外専用 | エストラーナテープ0.36mg | 0.36mg/枚, 70枚 |
| 院外専用 | エストラーナテープ0.72mg | 0.72mg/1枚(9cm ²) |
| 院外専用 | エストラサイトカプセル156.7mg | 140mg/Cap(エストラムスチンリン酸エステルとして) |
| 院外専用 | エストリール錠1mg | 1mg/錠 |
| 院外専用 | エックスフォージ配合錠 | 1錠 |
| 院外専用 | エディロールカプセル0.75 μ g | 0.75 μ g/Cap |
| 院外専用 | エナジア吸入用カプセル中用量(7Cap/枚) | 1Cap |
| 院外専用 | エネーゴ配合経腸用液 | 250mL/缶 |
| 院外専用 | エピスタ錠60mg | 60mg/錠 |
| 院外専用 | エピデュオゲル15g | 15g/本 |
| 院外専用 | エピベン注射液0.15mg | 1mg2mL/本(1回注射量0.3mL) |
| 院外専用 | エビリファイ錠12mg | 12mg/錠 |
| 院外専用 | エビリファイ内用液0.1% | 1mg/mL/包 |
| 院外専用 | エピレオプチマル散50% | 500mg/g |
| 院外専用 | エフメノカプセル100mg | 100mg/Cap |
| 院外専用 | エベレンゾ錠100mg | 100mg/錠 |
| 院外専用 | エベレンゾ錠20mg | 20mg/錠 |
| 院外専用 | エベレンゾ錠50mg | 50mg/錠 |
| 院外専用 | エレルサ錠50mg | 50mg/錠 |
| 院外専用 | エンシュア・H(味指定なし) | 250mL/缶 |
| 院外専用 | エンドキサン錠50mg | 50mg/錠 |
| 院外専用 | オーキシス9 μ gタービュヘイラー28吸入 | 252 μ g/本(1回吸入量:9 μ g) |
| 院外専用 | オキサロールローション25 μ g/g | (25 μ g/g)10g/本 |
| 院外専用 | オクソラレンローション1% | (10mg/g)30mL/本 |
| 院外専用 | オクソラレン錠10mg | 10mg/錠 |

| | | |
|------|----------------------------|-------------------------------------|
| 院外専用 | オゼンピック皮下注2mg | 2mg1.5mL/キット |
| 院外専用 | オダイン錠125mg | 125mg/錠 |
| 院外専用 | オテズラ錠10mg | 10mg/錠 |
| 院外専用 | オテズラ錠20mg | 20mg/錠 |
| 院外専用 | オテズラ錠30mg | 30mg/錠 |
| 院外専用 | オルベスコ100 μ gインヘラー56吸入用 | 5.6mg3.3g/缶 |
| 院外専用 | オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用 | 11.2mg3.3g/缶 56回(1回吸入量:200 μ g) |
| 院外専用 | オルベスコ50 μ gインヘラー112吸入用 | 5.6mg6.6g/缶 |
| 院外専用 | オルミエント錠2mg | 2mg/錠 |
| 院外専用 | オルミエント錠4mg | 4mg/錠 |
| 院外専用 | オルメテックOD錠20mg | 20mg/錠 |
| 院外専用 | オロパタジン点眼液0.1%「サンド」 | (1mg/mL) 5mL/本 |
| 院外専用 | オングリザ錠2.5mg | 2.5mg/錠 |
| 院外専用 | オングリザ錠5mg | 5mg/錠 |
| 院外専用 | オンプレス吸入用カプセル150 μ g | 150 μ g/Cap |
| 院外専用 | カイトリル錠1mg | 1mg/錠 |
| 院外専用 | カイトリル錠2mg | 2mg/錠 |
| 院外専用 | ガスターD錠20mg | 20mg/錠 |
| 院外専用 | ガスマチン錠5mg | 5mg/錠 |
| 院外専用 | カソデックスOD錠80mg | 80mg/錠 |
| 院外専用 | ガチフロ点眼液0.3% | (3mg/mL) 5mL/本 |
| 院外専用 | カデュエット配合錠4番 | 1錠 |
| 院外専用 | カナグルOD錠100mg | 100mg/錠 |
| 院外専用 | カナグル錠100mg | 100mg/錠 |
| 院外専用 | カバサール錠0.25mg | 0.25mg/錠 |
| 院外専用 | カボメティクス錠20mg | 20mg/錠 |
| 院外専用 | カボメティクス錠60mg | 60mg/錠 |
| 院外専用 | ガランターゼ散50% | 50% 500mg/g |
| 院外専用 | カリメート経口液20% (味指定なし) | 5.0g25g/包 |
| 院外専用 | カリメート散 | 5g/包 |
| 院外専用 | カルスロット錠20 | 20mg/錠 |
| 院外専用 | カルタン錠500mg | 500mg/錠 |
| 院外専用 | カルデナリン錠1mg | 1mg/錠 |
| 院外専用 | キックリンカプセル250mg | 250mg/Cap |
| 院外専用 | キャブピリン配合錠 | 1錠 |
| 院外専用 | キューバル50エアゾール | 7mg8.7g/缶(1回の噴霧主薬量:50 μ g) |
| 院外専用 | グーフィス錠5mg | 5mg/錠 |
| 院外専用 | グラアルファ配合点眼液 | 5mL/本 |
| 院外専用 | グラクティブ錠100mg | 100mg/錠 |
| 院外専用 | グラクティブ錠25mg | 25mg/錠 |
| 院外専用 | グラクティブ錠50mg | 50mg/錠 |
| 院外専用 | クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠〔EKT-25〕 | 1錠 |
| 院外専用 | クラシエ五苓散料エキス錠〔EKT-17〕 | 0.127g/錠 |
| 院外専用 | クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒〔EK-12〕 | 2.0g/包 |
| 院外専用 | クラシエ十味敗毒湯エキス細粒〔KB-6〕 | 3.0g/包 |
| 院外専用 | クラシエ小青竜湯エキス錠〔EKT-19〕 | 252錠(3錠×6連包×14シート) |
| 院外専用 | クラシエ人参養栄湯エキス細粒〔EK-108〕 | 2.5g/包 |
| 院外専用 | クラシエ半夏厚朴湯エキス錠〔EKT-16〕 | 1錠 |
| 院外専用 | クラシエ半夏瀉心湯エキス錠〔EKT-14〕 | 1錠 |
| 院外専用 | グラジナ錠50mg | 50mg/錠 |
| 院外専用 | クラビット錠500mg | 500mg/錠 |
| 院外専用 | クラリチン錠10mg | 10mg/錠 |
| 院外専用 | グランダキシン錠50 | 50mg/錠 |
| 院外専用 | グリベック錠100mg | 100mg/錠 |
| 院外専用 | グリミクロンHA錠20mg | 20mg/錠 |
| 院外専用 | グルベス配合OD錠 | 1錠 |
| 院外専用 | クレストールOD錠2.5mg | 2.5mg/錠 |
| 院外専用 | クレストール錠5mg | 5mg/錠 |
| 院外専用 | クレナフィン爪外用液10% | 10%3.56g(4mL) 1本 |
| 院外専用 | クロミッド錠50mg | 50mg/錠 |
| 院外専用 | ケイキサレートドライシロップ76% | 76%3.27g/包 |
| 院外専用 | ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」 | 250mg/錠 |

| | | |
|------|------------------------|------------------------------|
| 院外専用 | ケラチナミンコーワクリーム20% | 20%25g/本 |
| 院外専用 | ケレンディア錠10mg | 10mg/錠 |
| 院外専用 | ケレンディア錠20mg | 20mg/錠 |
| 院外専用 | コムクロシャンプー0.05% | 0.05%125mL/本 |
| 院外専用 | コレクチム軟膏0.25% | 0.25%5g/本 |
| 院外専用 | コレクチム軟膏0.5% | 0.5%5g/本 |
| 院外専用 | コンバントリンドライシロップ100mg | 100mg/包 (1g) |
| 院外専用 | コンプラミン配合錠 | 1錠 |
| 院外専用 | サイバインコ錠100mg | 100mg/錠 |
| 院外専用 | サイバインコ錠50mg | 50mg/錠 |
| 院外専用 | ザクラス配合錠HD | 1錠 |
| 院外専用 | ザジテン点鼻液0.05% | 4.398mg8mL/瓶 |
| 院外専用 | サノレックス錠0.5mg | 0.5mg/錠 |
| 院外専用 | ザファテック錠100mg | 100mg/錠 |
| 院外専用 | サリグレンカプセル30mg | 30mg/Cap |
| 院外専用 | ザルティア錠5mg | 5mg/錠 |
| 院外専用 | サワシリンカプセル250mg | 250mg/Cap |
| 院外専用 | シーブリ吸入用カプセル50 μ g | 50 μ g/Cap |
| 院外専用 | ジェイゾロフトOD錠100mg | 100mg/錠 |
| 院外専用 | ジェイゾロフトOD錠25mg | 25mg/錠 |
| 院外専用 | ジェミーナ配合錠(21錠/枚) | 21錠/枚 |
| 院外専用 | ジェミーナ配合錠(28錠/枚) | 28錠/枚 |
| 院外専用 | シグマート錠5mg | 5mg/錠 |
| 院外専用 | ジゴシン錠0.25mg | 0.25mg/錠 |
| 院外専用 | ジセレカ錠100mg | 100mg/錠 |
| 院外専用 | ジセレカ錠200mg | 200mg/錠 |
| 院外専用 | シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU | 1錠 |
| 院外専用 | シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU | 1錠 |
| 院外専用 | ジピリダモール散12.5%「JG」 | 12.5%125mg/g |
| 院外専用 | シムビコートタービュヘイラー30吸入 | 30吸入/本 |
| 院外専用 | ジャディアン錠25mg | 25mg/錠 |
| 院外専用 | ジュリナ錠0.5mg | 0.5mg/錠 |
| 院外専用 | ジルテック錠10 | 10mg/錠 |
| 院外専用 | シングレア錠10mg | 10mg/錠 |
| 院外専用 | スイニー錠100mg | 100mg/錠 |
| 院外専用 | スージャス配合錠 | 1錠 |
| 院外専用 | スタレボ配合錠L100 | 1錠 |
| 院外専用 | スタレボ配合錠L50 | 1錠 |
| 院外専用 | ストラテラカプセル10mg | 10mg/Cap |
| 院外専用 | ストラテラカプセル25mg | 25mg/Cap |
| 院外専用 | ストラテラカプセル40mg | 40mg/Cap |
| 院外専用 | ストラテラカプセル5mg | 5mg/Cap |
| 院外専用 | ストラテラ内用液0.4% | 0.4%100mL/V |
| 院外専用 | スパカール錠40mg | 40mg/錠 |
| 院外専用 | スピール膏M | 25cm ² /枚 |
| 院外専用 | スピオルトレスピマット60吸入 | 60吸入/キット |
| 院外専用 | スピリーバ吸入用カプセル18 μ g | 18 μ g/Cap |
| 院外専用 | スミスリンローション5% | 50mg/g |
| 院外専用 | ゼジュラ錠100mg | 100mg/錠 |
| 院外専用 | セディール錠10mg | 10mg/錠 |
| 院外専用 | セディール錠5mg | 5mg/錠 |
| 院外専用 | セバゾン散1% | 10mg/g |
| 院外専用 | ゼビアックスローション2% | 2%10g/本 |
| 院外専用 | ゼビアックス油性クリーム2% | 2%10g/本 |
| 院外専用 | ゼフィックス錠100 | 100mg/錠 |
| 院外専用 | セルシン散1% | 10mg/g |
| 院外専用 | セルベックスカプセル50mg | 50mg/Cap |
| 院外専用 | セレクトール錠200mg | 200mg/錠 |
| 院外専用 | セレニカR錠400mg | 400mg/錠 |
| 院外専用 | セレネース錠3mg | 3mg/錠 |
| 院外専用 | セレベント50ディスクス | 50 μ g/プリスター・60プリスター/キット |
| 院外専用 | セロクエル100mg錠 | 100mg/錠 |

| | | |
|------|---------------------------------|--------------------|
| 院外専用 | ゼンタコートカプセル3mg | 3mg/Cap |
| 院外専用 | ソーテイクツ錠6mg | 6mg/錠 |
| 院外専用 | ゾーミグRM錠2.5mg | 2.5mg/錠 |
| 院外専用 | ソリクア配合注ソロスター | 300単位3mL/キット |
| 院外専用 | ゾルトファイ配合注フレックスタッチ | 300単位3mL/キット |
| 院外専用 | ダーブロック錠1mg | 1mg/錠 |
| 院外専用 | ダイアコートクリーム0.05% | 0.05%5g/本 |
| 院外専用 | ダイアコート軟膏0.05% | (0.5mg/g) 5g/本 |
| 院外専用 | ダイアモックス末 | 末 |
| 院外専用 | タウリン散98%「大正」 | 1g/包 (1.02g) |
| 院外専用 | タグリッソ錠40mg | 40mg/錠 |
| 院外専用 | タケブロンOD錠15 | 15mg/錠 |
| 院外専用 | タケルダ配合錠 | 1錠 |
| 院外専用 | タプコム配合点眼液 | 2.5mL/本 |
| 院外専用 | タプロスミニ点眼液0.0015% | 0.0015%0.3mL/本 |
| 院外専用 | タプロス点眼液0.0015% | 0.0015%2.5mL/本 |
| 院外専用 | タモキシフェン錠20mg「DSEP」 | 20mg/錠 |
| 院外専用 | タリージェOD錠10mg | 10mg/錠 |
| 院外専用 | タリージェOD錠2.5mg | 2.5mg/錠 |
| 院外専用 | タリオン錠10mg | 10mg/錠 |
| 院外専用 | タリムス点眼液0.1% | 0.1%5mL/本 |
| 院外専用 | チャンピックス錠1mg | 1mg/錠 |
| 院外専用 | チラーゼンS錠25 μ g | 25 μ g/錠 |
| 院外専用 | ツベルミン錠100mg | 100mg/錠 |
| 院外専用 | ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)〔TJ-3〕 | 2.5g/包 |
| 院外専用 | ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)〔TJ-106〕 | 2.5g/包 |
| 院外専用 | ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)〔TJ-2〕 | 2.5g/包 |
| 院外専用 | ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)〔TJ-18〕 | 2.5g/包 |
| 院外専用 | ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)〔TJ-50〕 | 2.5g/包 |
| 院外専用 | ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用)〔TJ-56〕 | 2.5g/包 |
| 院外専用 | ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)〔TJ-70〕 | 2.5g/包 |
| 院外専用 | ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)〔TJ-96〕 | 2.5g/包 |
| 院外専用 | ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)〔TJ-9〕 | 2.5g/包 |
| 院外専用 | ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)〔TJ-19〕 | 3g/包 |
| 院外専用 | ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)〔TJ-53〕 | 2.5g/包 |
| 院外専用 | ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)〔TJ-40〕 | 2.5g/包 |
| 院外専用 | ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)〔TJ-47〕 | 2.5g/包 |
| 院外専用 | ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)〔TJ-38〕 | 2.5g/包 |
| 院外専用 | ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)〔TJ-7〕 | 2.5g/包 |
| 院外専用 | ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)〔TJ-37〕 | 2.5g/包 |
| 院外専用 | ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)〔TJ-39〕 | 2.5g/包 |
| 院外専用 | ティーエスワン配合カプセルT20 | 20mg/Cap (テガフル相当量) |
| 院外専用 | ティーエスワン配合カプセルT25 | 25mg/Cap (テガフル相当量) |
| 院外専用 | ディオバン錠80mg | 80mg/錠 |
| 院外専用 | ディナゲスト錠0.5mg | 0.5mg/錠 |
| 院外専用 | ディビゲル1mg | 1mg1g/包 |
| 院外専用 | ディレグラ配合錠 | 1錠 |
| 院外専用 | テネリア錠20mg | 20mg/錠 |
| 院外専用 | デバス錠0.5mg | 0.5mg/錠 |
| 院外専用 | デベルザ錠20mg | 20mg/錠 |
| 院外専用 | デュアック配合ゲル | 10g1本 |
| 院外専用 | デュオトラバ配合点眼液 | 2.5mL/本 |
| 院外専用 | テリルジー100エリブタ30吸入用 | 30吸入/キット |
| 院外専用 | テリルジー200エリブタ30吸入用 | 30吸入/キット |
| 院外専用 | トピロリック錠40mg | 40mg/錠 |
| 院外専用 | ドプスOD錠100mg | 100mg/錠 |
| 院外専用 | ドブレレット錠20mg | 20mg/錠 |
| 院外専用 | ドゴベットゲル | 15g/本 |
| 院外専用 | ドゴベットフォーム | 60g/本 |
| 院外専用 | ドゴベット軟膏 | 15g/本 |
| 院外専用 | ドラール錠15 | 15mg/錠 |
| 院外専用 | トラディアンス配合錠AP | 1錠 |

| | | |
|------|--------------------------------|----------------------------|
| 院外専用 | トラディアンズ配合錠BP | 1錠 |
| 院外専用 | トラバタンズ点眼液0.004% | 0.004%2.5mL/本 |
| 院外専用 | トランサミンシロップ5% | 5%50mg/mL |
| 院外専用 | トランサミン錠250mg | 250mg/錠 |
| 院外専用 | トリンテリックス錠10mg | 10mg/錠 |
| 院外専用 | トリンテリックス錠20mg | 20mg/錠 |
| 院外専用 | トレドミン錠15mg | 15mg/錠 |
| 院外専用 | ニバジール錠4mg | 4mg/錠 |
| 院外専用 | ニューベクオ錠300mg | 300mg/錠 |
| 院外専用 | ネイリンカプセル100mg | 100mg/Cap |
| 院外専用 | ネオキシテープ73.5mg | 73.5mg/枚 |
| 院外専用 | ネオドバトン配合錠L100 | 1錠 |
| 院外専用 | ネシーナ錠25mg | 25mg/錠 |
| 院外専用 | ノバルジン顆粒5% | 50mg/g |
| 院外専用 | ノルスバンテープ10mg | 10mg/枚 |
| 院外専用 | ノルスバンテープ20mg | 20mg/枚 |
| 院外専用 | ノルバデックス錠10mg | 10mg/錠 |
| 院外専用 | ノルバデックス錠20mg | 20mg/錠 |
| 院外専用 | ハーボニー配合錠 | 1錠 |
| 院外専用 | ハイコバルカプセル500 μ g | 500 μ g/Cap |
| 院外専用 | ハイベン錠200mg | 200mg/錠 |
| 院外専用 | パキシルCR錠12.5mg | 12.5mg/錠 |
| 院外専用 | バクスミー点鼻粉末剤3mg | 3mg/瓶 |
| 院外専用 | バクタ配合顆粒 | 1g/包 |
| 院外専用 | パナルジン錠100mg | 100mg/錠 |
| 院外専用 | バナンドライシロップ5% | 50mg/g |
| 院外専用 | パピロックミニ点眼液0.1% | 0.1%0.4mL/本 |
| 院外専用 | バフセオ錠150mg | 150mg/錠 |
| 院外専用 | バフセオ錠300mg | 300mg/錠 |
| 院外専用 | パラミヂンカプセル300mg | 300mg/Cap |
| 院外専用 | パリエット錠10mg | 10mg/錠 |
| 院外専用 | バルトレックス錠500 | 500mg/錠 |
| 院外専用 | ハルナールD錠0.2mg | 0.2mg/錠 |
| 院外専用 | バルミコート200 μ gタービュヘイラー112吸入 | 22.4mg/本(1吸入量：200 μ g) |
| 院外専用 | バルモディア錠0.1mg | 0.1mg/錠 |
| 院外専用 | ビ・シフロール錠0.5mg | 0.5mg/錠 |
| 院外専用 | ビートル顆粒分包250mg | 250mg/包 |
| 院外専用 | ビオスミン配合散 | 500g/本 |
| 院外専用 | ビオフェルミン錠剤 | 12mg/錠 |
| 院外専用 | ビムパットドライシロップ10% | 100mg/g |
| 院外専用 | ピメノールカプセル50mg | 50mg/Cap |
| 院外専用 | ヒューマリンN注ミリオペン | 300単位3mL/キット |
| 院外専用 | ヒューマログミックス25注ミリオペン | 300単位/キット |
| 院外専用 | ヒューマログミックス50注ミリオペン | 300単位/キット |
| 院外専用 | ヒューマログ注100単位/mL | 10mL/瓶 |
| 院外専用 | ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL | 40mg0.4mL/筒 |
| 院外専用 | ピラノアOD錠20mg | 20mg/錠 |
| 院外専用 | ヒルドイドクリーム0.3% | 0.3%20g/本 |
| 院外専用 | ヒルドイドソフト軟膏0.3% | 0.3%25g/本 |
| 院外専用 | ヒルドイドフォーム0.3% | 原液92g/缶 |
| 院外専用 | ヒルドイドローション0.3% | 0.3%50g/本 |
| 院外専用 | ビレーズトリエアロスフィア120吸入 | 120吸入/キット |
| 院外専用 | ファムビル錠250mg | 250mg/錠 |
| 院外専用 | フィコンパ細粒1% | 10mg/g |
| 院外専用 | ブイタマクリーン1% | 10mg/g |
| 院外専用 | ブイフェンド錠200mg | 200mg/錠 |
| 院外専用 | ブイフェンド錠50mg | 50mg/錠 |
| 院外専用 | フェアストン錠40 | 40mg/錠 |
| 院外専用 | フェロミア錠50mg | 470.9mg(鉄として50mg)/錠 |
| 院外専用 | フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ8mg「テイコク」 | 8mg/枚 |
| 院外専用 | フェントステープ0.5mg | 0.5mg/枚 |
| 院外専用 | フェントステープ8mg | 8mg/枚 |

| | | |
|------|--------------------------|--------------------------|
| 院外専用 | フオイパン錠100mg | 100mg/錠 |
| 院外専用 | フォゼベル錠10mg | 10mg/錠 |
| 院外専用 | フォゼベル錠20mg | 20mg/錠 |
| 院外専用 | フォゼベル錠30mg | 30mg/錠 |
| 院外専用 | フォゼベル錠5mg | 5mg/錠 |
| 院外専用 | ブラダロン錠200mg | 200mg/錠 |
| 院外専用 | プラビックス錠75mg | 75mg/錠 |
| 院外専用 | フランドルテープ40mg | 40mg/枚 |
| 院外専用 | フリバスOD錠75mg | 75mg/錠 |
| 院外専用 | プリンペランシロップ0.1% | 1mg/mL |
| 院外専用 | ブルゼニド錠12mg | 12mg/錠 |
| 院外専用 | フルタイド100ディスカス | 100 μ g60プリスター/個 |
| 院外専用 | フルタイド200ディスカス | 200 μ g・60プリスター/個 |
| 院外専用 | フルティフォーム125エアゾール120吸入用 | 120吸入/瓶 |
| 院外専用 | フルティフォーム50エアゾール120吸入用 | 120吸入/瓶 |
| 院外専用 | プレタールOD錠50mg | 50mg/錠 |
| 院外専用 | プレドニン眼軟膏 | 5g/本 |
| 院外専用 | プレマリン錠0.625mg | 0.625mg/錠 |
| 院外専用 | プレミネント配合錠LD | 1錠 |
| 院外専用 | プロセキソール錠0.5mg | 0.5mg/錠 |
| 院外専用 | プロトピック軟膏0.03%小児用 | (0.3mg/g) 5g/本 |
| 院外専用 | プロマックD錠75 | 75mg/錠 |
| 院外専用 | プロメライン軟膏5万単位/g | (50,000単位/g) 20g/本 |
| 院外専用 | ベイスン錠0.3mg | 0.3mg/錠 |
| 院外専用 | ベージニオ錠100mg | 100mg/錠 |
| 院外専用 | ベージニオ錠150mg | 150mg/錠 |
| 院外専用 | ベージニオ錠50mg | 50mg/錠 |
| 院外専用 | ベオーバ錠50mg | 50mg/錠 |
| 院外専用 | ベガモックス点眼液0.5% | (5mg/mL) 5mL/本 |
| 院外専用 | ベザトールSR錠200mg | 200mg/錠 |
| 院外専用 | ベシケアOD錠2.5mg | 2.5mg/錠 |
| 院外専用 | ベシケアOD錠5mg | 5mg/錠 |
| 院外専用 | ベスタチンカプセル30mg | 30mg/Cap |
| 院外専用 | ベストロン耳鼻科用1% | 50mg5mL/本(溶解後) |
| 院外専用 | ベセルナクリーム5% | 12.5mg/包(250mg) |
| 院外専用 | ベタキンロール点眼液0.5%「SW」 | (5mg/mL) 5mL/本 |
| 院外専用 | ベネット錠17.5mg | 17.5mg/錠 |
| 院外専用 | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」 | 0.3%200g/本 |
| 院外専用 | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」 | 0.3%100g/本 |
| 院外専用 | ベピオローション2.5% | 2.5%15g/本 |
| 院外専用 | ベリアクチン散1% | 10mg/g |
| 院外専用 | ベルソムラ錠10mg | 10mg/錠 |
| 院外専用 | ペロテックエロゾル100 | 20mg10mL/ポンベ(1回噴霧中0.1mg) |
| 院外専用 | ペンタサ注腸1g | 1g100mL/個 |
| 院外専用 | ペンタサ顆粒94% | (250,500,1000,2000mg) /包 |
| 院外専用 | ホクナリンテープ1mg | 1mg/枚 |
| 院外専用 | ホスミシンS耳科用3% | 300mg10mL/本(溶解後) |
| 院外専用 | ホスレノールOD錠500mg | 500mg/錠 |
| 院外専用 | ポナロン経口ゼリー35mg | 35mg/包(2g) |
| 院外専用 | ポナロン錠35mg | 35mg/錠 |
| 院外専用 | ポノサップバック400 | 1シート |
| 院外専用 | ポノピオンバック | 1シート |
| 院外専用 | ホリナート錠25mg「タイハウ」 | 25mg/錠 |
| 院外専用 | ボルタレンサゴ25mg | 25mg/個 |
| 院外専用 | ボルタレンサゴ50mg | 50mg/個 |
| 院外専用 | ボルタレン錠25mg | 25mg/錠 |
| 院外専用 | ボンゾール錠100mg | 100mg/錠 |
| 院外専用 | ボンビバ錠100mg | 100mg/錠 |
| 院外専用 | マーデュオックス軟膏 | 10g/本 |
| 院外専用 | マイザー軟膏0.05% | (0.5mg/g) 5g/本 |
| 院外専用 | マイスリー錠10mg | 10mg/錠 |
| 院外専用 | マヴィレット配合錠 | 1錠 |

| | | |
|------|-----------------------------|--------------------------|
| 院外専用 | マリゼブ錠12.5mg | 12.5mg/錠 |
| 院外専用 | マリゼブ錠25mg | 25mg/錠 |
| 院外専用 | マンジャロ皮下注10mgアテオス | 10mg0.5mL/キット |
| 院外専用 | マンジャロ皮下注12.5mgアテオス | 12.5mg0.5mL/キット |
| 院外専用 | マンジャロ皮下注15mgアテオス | 15mg0.5mL/キット |
| 院外専用 | マンジャロ皮下注5mgアテオス | 5mg0.5mL/キット |
| 院外専用 | マンジャロ皮下注7.5mgアテオス | 7.5mg0.5mL/キット |
| 院外専用 | ミカムロ配合錠AP | 1錠 |
| 院外専用 | ミカルディス錠40mg | 40mg/錠 |
| 院外専用 | ミケランLAカプセル15mg | 15mg/Cap |
| 院外専用 | ミケルナ配合点眼液 | 2.5mL/本 |
| 院外専用 | ミティキュア ダニ舌下錠10,000JAU | 1錠 |
| 院外専用 | ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU | 1錠 |
| 院外専用 | ミニリンメルトOD錠25 μ g | 25 μ g/錠 |
| 院外専用 | ミネプロ錠2.5mg | 2.5mg/錠 |
| 院外専用 | ミノマイシン錠50mg | 50mg/錠 |
| 院外専用 | ムコスタ錠100mg | 100mg/錠 |
| 院外専用 | ムコスタ点眼液UD2% | 2%0.35mL/本 |
| 院外専用 | ムコソルバンL錠45mg | 45mg/錠 |
| 院外専用 | ムコソルバン錠15mg | 15mg/錠 |
| 院外専用 | ムコダインDS50% | 50% 500mg/g |
| 院外専用 | ムコダインシロップ5% | 50mg/mL |
| 院外専用 | ムコダイン錠500mg | 500mg/錠 |
| 院外専用 | メソトレキセート錠2.5mg | 2.5mg/錠 |
| 院外専用 | メタルカプターゼカプセル100mg | 100mg/Cap |
| 院外専用 | メトアナ配合錠HD | 1錠 |
| 院外専用 | メトアナ配合錠LD | 1錠 |
| 院外専用 | メトグルコ錠500mg | 500mg/錠 |
| 院外専用 | メトジェクト皮下注10mgシリンジ | 10mg0.2mL/筒 |
| 院外専用 | メトジェクト皮下注12.5mgシリンジ | 12.5mg0.25mL/筒 |
| 院外専用 | メトジェクト皮下注15mgシリンジ | 15mg0.3mL/筒 |
| 院外専用 | メプチンシロップ5 μ g/mL | 5 μ g/mL |
| 院外専用 | メプチンスイングヘラー10 μ g吸入100回 | 1mg/キット (1吸入中10 μ g) |
| 院外専用 | メプチンミニ錠25 μ g | 25 μ g/錠 |
| 院外専用 | メプチン吸入液ユニット0.3mL | 100 μ g/mL (0.3mL/個) |
| 院外専用 | メマリーOD錠10mg | 10mg/錠 |
| 院外専用 | メマリーOD錠20mg | 20mg/錠 |
| 院外専用 | メラトベル顆粒小児用0.2% | 2mg/g |
| 院外専用 | メルカゾール錠2.5mg | 2.5mg/錠 |
| 院外専用 | モイゼルト軟膏0.3% | (3mg/g) 10g/本 |
| 院外専用 | モイゼルト軟膏1% | (10mg/g) 10g/本 |
| 院外専用 | モーバー錠100mg | 100mg/錠 |
| 院外専用 | モービック錠10mg | 10mg/錠 |
| 院外専用 | モーラステープL40mg | 10cm×14cm/枚 |
| 院外専用 | モーラスパップXR120mg | 10cm×14cm/枚 |
| 院外専用 | モーラスパップXR240mg | 20cm×14cm/枚 |
| 院外専用 | ヤーズフレックス配合錠 | 1錠 |
| 院外専用 | ユーエフティE配合顆粒T150 | 0.75g/包 |
| 院外専用 | ユーエフティE配合カプセルT100 | Cap |
| 院外専用 | ユーバスタ軟膏 | 100g/本 |
| 院外専用 | ユーロジン2mg錠 | 2mg/錠 |
| 院外専用 | ユニシア配合錠HD | 1錠 |
| 院外専用 | ユベラ軟膏 | 56g/本 |
| 院外専用 | ユリーフOD錠4mg | 4mg/錠 |
| 院外専用 | ユリス錠0.5mg | 0.5mg/錠 |
| 院外専用 | ユリス錠1mg | 1mg/錠 |
| 院外専用 | ユリス錠2mg | 2mg/錠 |
| 院外専用 | ヨーデルS糖衣錠-80 | 80mg/錠 |
| 院外専用 | ヨクイニンエキス散「コタロー」 | 2.0g/包 |
| 院外専用 | ラキソベロン内用液0.75% | 0.75%10mL/本 |
| 院外専用 | ラクツロース・シロップ60%「コーワ」 | 60%500mL/瓶 |
| 院外専用 | ラコールNF配合経腸用液 | 200mL/パウチ |

| | | |
|------|-----------------------|--------------------------|
| 院外専用 | ラシックス錠40mg | 40mg/錠 |
| 院外専用 | ラスビック錠75mg | 75mg/錠 |
| 院外専用 | ラベファインパック | 1シート |
| 院外専用 | ランタスXR注シロスター | 450単位1.5mL/キット |
| 院外専用 | ランタス注シロスター | 300単位/キット |
| 院外専用 | ランデル錠40 | 40mg/錠 |
| 院外専用 | リオベル配合錠LD | 1錠 |
| 院外専用 | リカルボン錠50mg | 50mg/錠 |
| 院外専用 | リクシアナOD錠60mg | 60mg/錠 |
| 院外専用 | リザベン点眼液0.5% | (5mg/mL) 5mL/瓶 |
| 院外専用 | リスバダール細粒1% | 10mg/g |
| 院外専用 | リスバダール内用液1mg/mL | 2mL/包 |
| 院外専用 | リットフォーロカプセル50mg | 50mg/錠 |
| 院外専用 | リバスタッチパッチ13.5mg | 13.5mg/枚 |
| 院外専用 | リバスタッチパッチ18mg | 18mg/枚 |
| 院外専用 | リバスタッチパッチ4.5mg | 4.5mg/枚 |
| 院外専用 | リバスタッチパッチ9mg | 9mg/枚 |
| 院外専用 | リバゼブ配合錠HD | 1錠 |
| 院外専用 | リバゼブ配合錠LD | 1錠 |
| 院外専用 | リバロOD錠2mg | 2mg/錠 |
| 院外専用 | リピトール錠10mg | 10mg/錠 |
| 院外専用 | リファジンカプセル150mg | 150mg/Cap |
| 院外専用 | リフヌア錠45mg | 45mg/錠 |
| 院外専用 | リベルサス錠14mg | 14mg/錠 |
| 院外専用 | リベルサス錠7mg | 7mg/錠 |
| 院外専用 | リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用 | 0.025%15mL/瓶 (レボカバチンとして) |
| 院外専用 | リポバス錠5 | 5mg/錠 |
| 院外専用 | リムバーザ錠100mg | 100mg/錠 |
| 院外専用 | リムバーザ錠150mg | 150mg/錠 |
| 院外専用 | リリカOD錠75mg | 75mg/錠 |
| 院外専用 | リリカカプセル25mg | 25mg/Cap |
| 院外専用 | リンヴォック錠15mg | 15mg/錠 |
| 院外専用 | リンヴォック錠7.5mg | 7.5mg/錠 |
| 院外専用 | リンデロン坐剤1.0mg | 1mg/個 |
| 院外専用 | リンデロン錠0.5mg | 0.5mg/錠 |
| 院外専用 | ルーラン錠8mg | 8mg/錠 |
| 院外専用 | ルコナック爪外用液5% | 3.5g/4mL |
| 院外専用 | ルセフィ錠2.5mg | 2.5mg/錠 |
| 院外専用 | ルナベル配合錠ULD | 1錠 |
| 院外専用 | ルネスタ錠1mg | 1mg/錠 |
| 院外専用 | ルムジェブ注100単位/mL | 1000単位10mL/瓶 |
| 院外専用 | ルムジェブ注ミリオペン | 300単位3mL/キット |
| 院外専用 | レイポー錠100mg | 100mg/錠 |
| 院外専用 | レキサルティOD錠0.5mg | 0.5mg/錠 |
| 院外専用 | レキサルティOD錠1mg | 1mg/錠 |
| 院外専用 | レキサルティOD錠2mg | 2mg/錠 |
| 院外専用 | レキソタン細粒1% | 10mg/g |
| 院外専用 | レキップCR錠8mg | 8mg/錠 |
| 院外専用 | レキップ錠0.25mg | 0.25mg/錠 |
| 院外専用 | レキップ錠1mg | 1mg/錠 |
| 院外専用 | レキップ錠2mg | 2mg/錠 |
| 院外専用 | レクタブル2mg注腸フォーム14回 | 30.8g/缶 |
| 院外専用 | レザルタス配合錠HD | 1錠 |
| 院外専用 | レナジェル錠250mg | 250mg/錠 |
| 院外専用 | レバグリニド錠0.5mg「サワイ」 | 0.5mg/錠 |
| 院外専用 | レミニールOD錠12mg | 12mg/錠 |
| 院外専用 | レミニールOD錠4mg | 4mg/錠 |
| 院外専用 | レミニールOD錠8mg | 8mg/錠 |
| 院外専用 | レルバックス錠20mg | 20mg/錠 |
| 院外専用 | レルベア100エリプタ30吸入用 | 30吸入/キット |
| 院外専用 | レルベア200エリプタ30吸入用 | 30吸入/キット |
| 院外専用 | レンドルミンD錠0.25mg | 0.25mg/錠 |

| | | |
|------|---------------------------------|-------------------------------|
| 院外専用 | ロイケリン散10% | 100mg/g |
| 院外専用 | ロートエキス散「ケンエー」 | 100mg/g |
| 院外専用 | ロキソニンテープ100mg | 100mg2g/枚(10cm×14cm/枚)(1袋：7枚) |
| 院外専用 | ロキソニン錠60mg | 60mg/錠 |
| 院外専用 | ロコアテープ | 10cm×14cm1枚 |
| 院外専用 | ロゼックスゲル0.75% | 15g/本 |
| 院外専用 | ロルカム錠4mg | 4mg/錠 |
| 院外専用 | ワントラム錠100mg | 100mg/錠 |
| 院外専用 | 小児用バクシダール錠50mg | 50mg/錠 |
| 院外専用 | 小児用レルベア50エリプタ30吸入用 | 30吸入/キット |
| 採用 | 25mgアリナミンF糖衣錠 | 25mg/錠 |
| 採用 | 2mgセルシン錠 | 2mg/錠 |
| 採用 | 5mgセルシン錠 | 5mg/錠 |
| 採用 | L-ケフレックス小児用顆粒 | 1g/包 |
| 採用 | MSコンチン錠10mg | 10mg/錠 |
| 採用 | PL配合顆粒 | 1g/包 |
| 採用 | アーテン錠(2mg) | 2mg/錠 |
| 採用 | アイセントレス錠400mg | 400mg/錠 |
| 採用 | アイトロール錠20mg | 20mg/錠 |
| 採用 | アイビーディカプセル100 | 100mg/Cap |
| 採用 | アキネトン錠1mg | 1mg/錠 |
| 採用 | アコファイド錠100mg | 100mg/錠 |
| 採用 | アザルフィジンEN錠250mg | 250mg/錠 |
| 採用 | アジルサルタン錠20mg「武田76」 | 20mg/錠 |
| 採用 | アジレクト錠1mg | 1mg/錠 |
| 採用 | アストミン錠10mg | 10mg/錠 |
| 採用 | アスピリン「ヨシダ」 | 100g/袋 |
| 採用 | アスペノンカプセル20 | 20mg/Cap |
| 採用 | アスベリンシロップ0.5% | 5mg/mL |
| 採用 | アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」 | 17.6%/mL |
| 採用 | アゾセミド錠60mg「JG」 | 60mg/錠 |
| 採用 | アタラックス-Pカプセル25mg | 25mg/Cap(ヒドロキシジン塩酸塩として) |
| 採用 | アデホスコーク顆粒10% | 100mg1g/包 |
| 採用 | アテレック錠10 | 10mg/錠 |
| 採用 | アトルバスタチン錠10mg「トーワ」 | 10mg/錠 |
| 採用 | アナストロゾール錠1mg「DSEP」 | 1mg/錠 |
| 採用 | アナフラニール錠10mg | 10mg/錠 |
| 採用 | アブストラル舌下錠100 μ g | 100 μ g/錠 |
| 採用 | アブストラル舌下錠200 μ g | 200 μ g/錠 |
| 採用 | アプレピタントカプセル125mg「NK」 | 125mg/Cap |
| 採用 | アプレピタントカプセル80mg「NK」 | 80mg/Cap |
| 採用 | アベロックス錠400mg | 400mg/錠 |
| 採用 | アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 | 100mg/錠 |
| 採用 | アミティーザカプセル12 μ g | 12 μ g/Cap |
| 採用 | アミノレバンEN配合散(コーヒー味) | 50g/包 |
| 採用 | アミノレバンEN配合散(フルーツ味) | 50g/包 |
| 採用 | アムロジピンOD錠5mg「杏林」 | 5mg/錠 |
| 採用 | アメナリーフ錠200mg | 200mg/錠 |
| 採用 | アモキシサンカプセル25mg | 25mg/Cap |
| 採用 | アモキシシリンカプセル250mg「日医工」 | 250mg/Cap |
| 採用 | アラグリオ内用剤1.5g | 1.5g/瓶 |
| 採用 | アリピプラゾール錠3mg「サワイ」 | 3mg/錠 |
| 採用 | アリピプラゾール内用液3mg分包「サワイ」 | 3mg3mL/包 |
| 採用 | アルジオキサ錠100mg「あすか」 | 100mg/錠 |
| 採用 | アルダクトンA細粒10% | 100mg/g |
| 採用 | アルドメット錠250 | 250mg/錠 |
| 採用 | アルファカルシドールカプセル0.25 μ g「トーワ」 | 0.25 μ g/Cap |
| 採用 | アルファカルシドールカプセル1 μ g「トーワ」 | 1 μ g/Cap |
| 採用 | アルファロール内用液0.5 μ g/mL | 0.5 μ g/mL, 10mL/瓶 |
| 採用 | アルロイドG内用液5% | 5g/100mL |
| 採用 | アレジオン錠20 | 20mg/錠 |
| 採用 | アレビアチン散10% | 100mg/g |

| | | |
|----|---------------------------------|----------------------|
| 採用 | アレビアチン錠25mg | 25mg/錠 |
| 採用 | アレロック顆粒0.5% | 2.5mg/包 (0.5g) |
| 採用 | アレンドロン酸錠 35mg 「NIG」 | 35mg/錠 |
| 採用 | アロチノロール塩酸塩錠10mg 「DSP」 | 10mg/錠 |
| 採用 | アロプリノール錠100mg 「杏林」 | 100mg/錠 |
| 採用 | アンブラーグ錠100mg | 100mg/錠 |
| 採用 | イーケプラドライシロップ50% | 50% 500mg/g |
| 採用 | イーケプラ錠500mg | 500mg/錠 |
| 採用 | イクスタンジ錠40mg | 40mg/錠 |
| 採用 | イグラチモド錠25mg 「あゆみ」 | 25mg/錠 |
| 採用 | イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg 「TC」 | 900mg/包 |
| 採用 | イスコチン錠100mg | 100mg/錠 |
| 採用 | イソソルビド内用液70% 「CEO」 | 350g500mL/瓶 |
| 採用 | イトラコナゾール内用液1% 「VTRS」 | 10mg/mL |
| 採用 | イノラス配合経腸用液 (いちご) | 187.5mL/パウチ |
| 採用 | イミダフェナシンOD錠 0.1mg 「杏林」 | 0.1mg/錠 |
| 採用 | イムラン錠50mg | 50mg/錠 |
| 採用 | インクレミンシロップ5% | 50mg/mL(Fe : 6mg/mL) |
| 採用 | インデラル錠10mg | 10mg/錠 |
| 採用 | ウテメリン錠5mg | 5mg/錠 |
| 採用 | ウブレチド錠5mg | 5mg/錠 |
| 採用 | ウルソデオキシコール酸錠100mg 「ZE」 | 100mg/錠 |
| 採用 | ウロカルン錠225mg | 225mg/錠 |
| 採用 | エクセグラン散20% | 200mg/g |
| 採用 | エクセグラン錠100mg | 100mg/錠 |
| 採用 | エクフィナ錠50mg | 50mg/錠 |
| 採用 | エサンプトール錠250mg | 250mg/錠 |
| 採用 | エスゾピクロン錠1mg「サワイ」 | 1mg/錠 |
| 採用 | エスタゾラム錠2mg 「アメル」 | 2mg/錠 |
| 採用 | エスワンタイホウ配合OD錠T20 | 20mg/錠 (テガフル相当量) |
| 採用 | エスワンタイホウ配合OD錠T25 | 25mg/錠 (テガフル相当量) |
| 採用 | エゼチミブ錠10mg 「DSEP」 | 10mg/錠 |
| 採用 | エソメプラゾールカプセル20mg 「ニプロ」 | 20mg/Cap |
| 採用 | エチゾラム錠0.5mg 「SW」 | 0.5mg/錠 |
| 採用 | エトドラク錠200mg 「SW」 | 200mg/錠 |
| 採用 | エドルミズ錠50mg | 50mg/錠 |
| 採用 | エネーボ配合経腸用液 | 250mL/缶 |
| 採用 | エバステルOD錠10mg | 10mg/錠 |
| 採用 | エバミール錠1.0 | 1mg/錠 |
| 採用 | エビプロスタット配合錠DB | 錠 |
| 採用 | エフィエントOD錠20mg | 20mg/錠 |
| 採用 | エフィエント錠3.75mg | 3.75mg/錠 |
| 採用 | エフビーOD錠2.5 | 2.5mg/錠 |
| 採用 | エブランチルカプセル15mg | 15mg/Cap |
| 採用 | エリキユース錠2.5mg | 2.5mg/錠 |
| 採用 | エリキユース錠5mg | 5mg/錠 |
| 採用 | エリスロマイシン錠200mg 「サワイ」 | 200mg/錠 |
| 採用 | エルカルチンFF内用液10% | 1g10mL/瓶 |
| 採用 | エルデカルシトールカプセル0.75 μ g 「トーワ」 | 0.75 μ g/錠 |
| 採用 | エレンタール配合内用剤 | 80g/袋 |
| 採用 | エンシュア・H(コーヒー味) | 250mL/缶 |
| 採用 | エンシュア・H(バニラ味) | 250mL/缶 |
| 採用 | エンタカポン錠100mg 「サンド」 | 100mg/錠 |
| 採用 | エンレスト錠100mg | 100mg/錠 |
| 採用 | エンレスト錠200mg | 200mg/錠 |
| 採用 | オーグメンチン配合錠250RS | (125mg + 250mg)/錠 |
| 採用 | オキシコンチンTR錠10mg | 10mg/錠 |
| 採用 | オキシコンチンTR錠20mg | 20mg/錠 |
| 採用 | オキシコンチンTR錠5mg | 5mg/錠 |
| 採用 | オキノーム散2.5mg | 2.5mg0.5g/包 |
| 採用 | オキノーム散20mg | 20mg/包 (1g) |
| 採用 | オキノーム散5mg | 5mg/包 (1g) |

| | | |
|----|-----------------------------|---------------------|
| 採用 | オゼックス錠150 | 150mg/錠 |
| 採用 | オセルタミビルDS3%「サワイ」 | 30mg/g |
| 採用 | オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」 | 75mg/Cap |
| 採用 | オノンカプセル112.5mg | 112.5mg/Cap |
| 採用 | オノンドライシロップ10% | 100mg/g |
| 採用 | オプソ内服液10mg | 10mg5mL/包 |
| 採用 | オプソ内服液5mg | 5mg2.5mL/包 |
| 採用 | オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」 | 2g/包 |
| 採用 | オランザピンOD錠2.5mg「アメル」 | 2.5mg/錠 |
| 採用 | オランザピンOD錠5mg「明治」 | 5mg/錠 |
| 採用 | オルミエント錠2mg | 2mg/錠 |
| 採用 | オルミエント錠4mg | 4mg/錠 |
| 採用 | オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 | 20mg/錠 |
| 採用 | オロバタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 5mg/錠 |
| 採用 | オンジェンティス錠25mg | 25mg/錠 |
| 採用 | ガスター散10% | 100mg/g |
| 採用 | ガストローム顆粒66.7% | 1g1.5g/包 |
| 採用 | ガスマチン散1% | 10mg/g |
| 採用 | カナマイシンカプセル250mg「明治」 | 250mg/Cap |
| 採用 | カナリア配合錠 | 1錠 |
| 採用 | カバサル錠1.0mg | 1mg/錠 |
| 採用 | カプトリル錠25mg | 25mg/錠 |
| 採用 | カペシタピン錠300mg「ヤクルト」 | 300mg/錠 |
| 採用 | カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」 | 100mg/錠 |
| 採用 | カリメート経口液20% アップルフレーバー | 5.0g25g/包 |
| 採用 | カルナクリン錠50 | 50単位/錠 |
| 採用 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「トーワ」 | 30mg/錠 |
| 採用 | カルブロック錠16mg | 16mg/錠 |
| 採用 | カルベジロール錠10mg「DSEP」 | 10mg/錠 |
| 採用 | カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 | 2.5mg/錠 |
| 採用 | カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」 | 50mg/mL |
| 採用 | カルボシステインシロップ50%「NIG」 | 50% 500mg/g |
| 採用 | カルボシステイン錠500mg「サワイ」 | 500mg/錠 |
| 採用 | コロナール細粒20% | 0.5g(100mg)/包 |
| 採用 | コロナール細粒20% | 1g(200mg)/包 |
| 採用 | コロナール細粒50% | 500mg/g |
| 採用 | コロナール細粒50% | 0.6g(300mg)/包 |
| 採用 | コロナール細粒50% | 1g(500mg)/包 |
| 採用 | コロナール錠200 | 200mg/錠 |
| 採用 | コロナール錠300 | 300mg/錠 |
| 採用 | カンデサルタン錠8mg「あすか」 | 8mg/錠 |
| 採用 | キネダック錠50mg | 50mg/錠 |
| 採用 | キプレス細粒4mg | 4mg/包 (0.5g) |
| 採用 | キョウニン水シオエ | 500mL/瓶 |
| 採用 | クービピック錠25mg | 25mg/錠 |
| 採用 | クエチアピン錠25mg「明治」 | 25mg/錠 |
| 採用 | クエンメット配合散 | 1g/包 |
| 採用 | クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 | 470.9mg(鉄として50mg)/錠 |
| 採用 | グラケーカプセル15mg | 15mg/Cap |
| 採用 | クラシエ加味帰脾湯エキス細粒〔EK-49〕 | 2.5g/包 |
| 採用 | クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒〔EK-25〕 | 2.0g/包 |
| 採用 | クラシエ柴苓湯エキス細粒〔EK-114〕 | 2.7g/包 |
| 採用 | クラシエ桃核承気湯エキス錠〔EKT-61〕 | 3錠/包 |
| 採用 | クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒〔EK-23〕 | 2.0g/包 |
| 採用 | クラシエ補中益気湯エキス細粒〔EK-41〕 | 2.5g/包 |
| 採用 | クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒〔EK-68〕 | 2g/包 |
| 採用 | クラバモックス小児用配合ドライシロップ | 0.505g/包 |
| 採用 | グラマリール細粒10% | 100mg/g |
| 採用 | クラリスロマイシンドライシロップ10%小児用「大正」 | 100mg/g |
| 採用 | クラリスロマイシン錠200mg「大正」 | 200mg/錠 |
| 採用 | クリアナール錠200mg | 200mg/錠 |
| 採用 | グリチロン配合錠 | 錠 |

| | | |
|----|-----------------------|----------------------|
| 採用 | グリミクロン錠40mg | 40mg/錠 |
| 採用 | グリメピリド錠1mg「VTRS」 | 1mg/錠 |
| 採用 | グルコンサンK細粒4mEq/g | 937mg/g (K : 4mEq/g) |
| 採用 | グルコンサンK錠5mEq | 1170mg/錠(K : 5mEq/錠) |
| 採用 | グレースビット錠50mg | 50mg/錠 |
| 採用 | クレメジン速崩錠500mg | 500mg/錠 |
| 採用 | クロビドグレル錠75mg「SANIK」 | 75mg/錠 |
| 採用 | ケイツーシロップ0.2% | 2mg1mL/包 |
| 採用 | ケタスカプセル10mg | 10mg/Cap |
| 採用 | ケフレックスカプセル250mg | 250mg/Cap |
| 採用 | コートリル錠10mg | 10mg/錠 |
| 採用 | コートン錠25mg | 25mg/錠 |
| 採用 | コスバノンカプセル40mg | 40mg/Cap |
| 採用 | コデインリン酸塩散1%「メタル」 | 10mg/g |
| 採用 | コニール錠4 | 4mg/錠 |
| 採用 | コメリアンコーワ錠50 | 50mg/錠 |
| 採用 | コルヒチン錠0.5mg「タカタ」 | 0.5mg/錠 |
| 採用 | コントミン糖衣錠25mg | 25mg/錠 |
| 採用 | サアミオン錠5mg | 5mg/錠 |
| 採用 | ザイザルシロップ0.05% | 0.5mg/mL |
| 採用 | ザイティガ錠250mg | 250mg/錠 |
| 採用 | サイトテック錠200 | 200 μ g/錠 |
| 採用 | サイレース錠1mg | 1mg/錠 |
| 採用 | サインバルタカプセル20mg | 20mg/Cap |
| 採用 | サムスカOD錠30mg | 30mg/錠 |
| 採用 | サムチレール内用懸濁液15% | 750mg5mL/包 |
| 採用 | サラジェン錠5mg | 5mg/錠 |
| 採用 | サラゾピリン錠500mg | 500mg/錠 |
| 採用 | ジェイゾロフトOD錠50mg | 50mg/錠 |
| 採用 | ジェニナック錠200mg | 200mg/錠 |
| 採用 | ジェノゲスト錠1mg「モチダ」 | 1mg/錠 |
| 採用 | シクレスト舌下錠5mg | 5mg/錠 |
| 採用 | シクロスポリンカプセル25mg「サンド」 | 25mg/Cap |
| 採用 | ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」 | 25mg/錠 |
| 採用 | ジゴシン散0.1% | 1mg/g |
| 採用 | ジスロマック細粒小児用10% | 100mg/g |
| 採用 | ジスロマック錠250mg | 250mg/錠 |
| 採用 | シナール配合顆粒 | 1g/包 |
| 採用 | シプロキササン錠200mg | 200mg/錠 |
| 採用 | シベノール錠100mg | 100mg/錠 |
| 採用 | ジメチコン錠40mg「フソー」 | 40mg/錠 |
| 採用 | ジャディアンス錠10mg | 10mg/錠 |
| 採用 | ジャヌビア錠50mg | 50mg/錠 |
| 採用 | シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」 | 50mg/錠 |
| 採用 | シロドシンOD錠4mg「DSEP」 | 4mg/錠 |
| 採用 | シングレアOD錠10mg | 10mg/錠 |
| 採用 | シングレアチュアブル錠5mg | 5mg/錠 |
| 採用 | シンメトレル錠50mg | 50mg/錠 |
| 採用 | スインプロイク錠0.2mg | 0.2mg/錠 |
| 採用 | スーグラ錠50mg | 50mg/錠 |
| 採用 | スタラシドカプセル100 | 100mg/Cap |
| 採用 | ストラテラカプセル5mg | 5mg/Cap |
| 採用 | ストロメクトール錠3mg | 3mg/錠 |
| 採用 | スピロラクトン錠25mg「日医工」 | 25mg/錠 |
| 採用 | スピロベント錠10 μ g | 10 μ g/錠 |
| 採用 | ズファジラン錠10mg | 10mg/錠 |
| 採用 | セイブル錠50mg | 50mg/錠 |
| 採用 | セバゾン錠1 | 1mg/錠 |
| 採用 | セバミット-R細粒2% | 20mg/g |
| 採用 | セファドール錠25mg | 25mg/錠 |
| 採用 | セファランチン錠1mg | 1mg/錠 |
| 採用 | セフジトレンピボキシル錠100mg「SW」 | 100mg/錠 |

| | | |
|----|-----------------------------|----------------|
| 採用 | セララ錠50mg | 50mg/錠 |
| 採用 | セルセプトカプセル250 | 250mg/Cap |
| 採用 | セレコキシブ錠100mg「VTRS」 | 100mg/錠 |
| 採用 | セレニカR顆粒40% | 400mg/g |
| 採用 | セレネース細粒1% | 10mg/g |
| 採用 | セレネース錠1mg | 1mg/錠 |
| 採用 | セロクエル細粒50% | 500mg/g |
| 採用 | セロクラール錠20mg | 20mg/錠 |
| 採用 | セロケン錠20mg | 20mg/錠 |
| 採用 | センノシド錠12mg「NIG」 | 12mg/錠 |
| 採用 | ゾコーバ錠125mg | 125mg/錠 |
| 採用 | ソセゴン錠25mg | 25mg/錠 |
| 採用 | ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」 | 25mg/錠 |
| 採用 | ゾフルーザ錠20mg | 20mg/錠 |
| 採用 | ソラナックス0.4mg錠 | 0.4mg/錠 |
| 採用 | ソランタール錠100mg | 100mg/錠 |
| 採用 | ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「杏林」 | 10mg/錠 |
| 採用 | ダーブロック錠2mg | 2mg/錠 |
| 採用 | ダーブロック錠4mg | 4mg/錠 |
| 採用 | ダーブロック錠6mg | 6mg/錠 |
| 採用 | ダイアモックス錠250mg | 250mg/錠 |
| 採用 | ダイフェン配合錠 | (400mg+80mg)/錠 |
| 採用 | ダイフェン配合顆粒 | (400mg+80mg)/g |
| 採用 | ダクチル錠50mg | 50mg/錠 |
| 採用 | タグリッソ錠80mg | 80mg/錠 |
| 採用 | タケキャブOD錠10mg | 10mg/錠 |
| 採用 | タケキャブOD錠20mg | 20mg/錠 |
| 採用 | タケキャブ錠10mg | 10mg/錠 |
| 採用 | タケキャブ錠20mg | 20mg/錠 |
| 採用 | タナトリル錠5 | 5mg/錠 |
| 採用 | タモキシフェン錠10mg「DSEP」 | 10mg/錠 |
| 採用 | ダラシンカプセル150mg | 150mg/Cap |
| 採用 | タリージェOD錠5mg | 5mg/錠 |
| 採用 | タルチレリンOD錠5mg「サワイ」 | 5mg/錠 |
| 採用 | ダントリウムカプセル25mg | 25mg/Cap |
| 採用 | タンニン酸アルブミンシオエ | 末 |
| 採用 | タンボコール錠50mg | 50mg/錠 |
| 採用 | チウラジール錠50mg | 50mg/錠 |
| 採用 | チガソソカプセル10 | 10mg/Cap |
| 採用 | チャンピックス錠0.5mg | 0.5mg/錠 |
| 採用 | チラーヂンS錠50 μ g | 50 μ g/錠 |
| 採用 | ツイミーグ錠500mg | 500mg/錠 |
| 採用 | ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用）〔TJ-24〕 | 2.5g/包 |
| 採用 | ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-1〕 | 2.5g/包 |
| 採用 | ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）〔TJ-107〕 | 2.5g/包 |
| 採用 | ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用）〔TJ-17〕 | 2.5g/包 |
| 採用 | ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-48〕 | 2.5g/包 |
| 採用 | ツムラ人参養栄湯エキス細粒（医療用）〔TJ-108〕 | 2.5g/包 |
| 採用 | ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-100〕 | 2.5g/包 |
| 採用 | ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-16〕 | 2.5g/包 |
| 採用 | ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-14〕 | 2.5g/包 |
| 採用 | ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用）〔TJ-126〕 | 2.5g/包 |
| 採用 | ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）〔TJ-54〕 | 2.5g/包 |
| 採用 | ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-43〕 | 2.5g/包 |
| 採用 | ツルバダ配合錠 | 1錠 |
| 採用 | デエビゴ錠2.5mg | 2.5mg/錠 |
| 採用 | デエビゴ錠5mg | 5mg/錠 |
| 採用 | デオフィリン徐放錠100mg「サワイ」 | 100mg/錠 |
| 採用 | デカドロン錠0.5mg | 0.5mg/錠 |
| 採用 | デカドロン錠4mg | 4mg/錠 |
| 採用 | デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」 | 0.1mg/mL |
| 採用 | デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」 | 15mg/錠 |

| | | |
|----|-------------------------------|---------------|
| 採用 | テグレート細粒50% | 500mg/g |
| 採用 | テグレート錠200mg | 200mg/錠 |
| 採用 | デザレックス錠5mg | 5mg/錠 |
| 採用 | テトラミド錠10mg | 10mg/錠 |
| 採用 | テネリアOD錠20mg | 20mg/錠 |
| 採用 | テノーミン錠25 | 25mg/錠 |
| 採用 | デノタスチュアブル配合錠(SP包装) | 1錠 |
| 採用 | デバケンR錠200mg | 200mg/錠 |
| 採用 | デバケンシロップ5% | 50mg/mL |
| 採用 | デフェラシクロス顆粒分包360mg「サンド」 | 360mg/包 |
| 採用 | デフェラシクロス顆粒分包90mg「サンド」 | 90mg/包 |
| 採用 | テプレノンカプセル50mg「トーワ」 | 50mg/Cap |
| 採用 | デプロメール錠25 | 25mg/錠 |
| 採用 | テモゾロミド錠100mg「NK」 | 100mg/錠 |
| 採用 | テモゾロミド錠20mg「NK」 | 20mg/錠 |
| 採用 | デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」 | 0.5mg/Cap |
| 採用 | デュファストン錠5mg | 5mg/錠 |
| 採用 | テルネリン錠1mg | 1mg/錠 |
| 採用 | テルミサルタン錠40mg「DSEP」 | 40mg/錠 |
| 採用 | トアラセット配合錠「杏林」 | 1錠 |
| 採用 | ドキサゾシン錠1mg「ニプロ」 | 1mg/錠 |
| 採用 | ドグマチール細粒10% | 100mg/g |
| 採用 | ドグマチール錠50mg | 50mg/錠 |
| 採用 | ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「ニプロ」 | 3mg/錠 |
| 採用 | ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「ニプロ」 | 5mg/錠 |
| 採用 | ドバコール配合錠L100 | 1錠 |
| 採用 | ドバストン散98.5% | 985mg/g |
| 採用 | トビエース錠4mg | 4mg/錠 |
| 採用 | トピナ錠50mg | 50mg/錠 |
| 採用 | トラセミドOD錠8mg「TE」 | 8mg/錠 |
| 採用 | トラゼンタ錠5mg | 5mg/錠 |
| 採用 | トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」 | 25mg/錠 |
| 採用 | トラネキサム酸錠250mg「YD」 | 250mg/錠 |
| 採用 | トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」 | 25mg/錠 |
| 採用 | ドラマミン錠50mg | 50mg/錠 |
| 採用 | トリクロロールシロップ10% | 100mg/mL |
| 採用 | トリプタノール錠10 | 10mg/錠 |
| 採用 | トリンテリックス錠10mg | 10mg/錠 |
| 採用 | トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」 | 7.5mg/錠 |
| 採用 | ナイキサン錠100mg | 100mg/錠 |
| 採用 | ナウゼリンOD錠5 | 5mg/錠 |
| 採用 | ナゼアOD錠0.1mg | 0.1mg/錠 |
| 採用 | ナトリックス錠1 | 1mg/錠 |
| 採用 | ナフトピジルOD錠25mg「トーワ」 | 25mg/錠 |
| 採用 | ナルサス錠2mg | 2mg/錠 |
| 採用 | ナルサス錠6mg | 6mg/錠 |
| 採用 | ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5 μ g「サワイ」 | 2.5 μ g/錠 |
| 採用 | ナルラピド錠1mg | 1mg/錠 |
| 採用 | ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」 | 100mg/g |
| 採用 | ニコランジル錠5mg「トーワ」 | 5mg/錠 |
| 採用 | ニトロペン舌下錠0.3mg | 0.3mg/錠 |
| 採用 | ニフェジピンCR錠20mg「NP」 | 20mg/錠 |
| 採用 | ニポラジン錠3mg | 3mg/錠 |
| 採用 | ニューロタン錠50mg | 50mg/錠 |
| 採用 | ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg | 20mg/包 |
| 採用 | ノイロトロピン錠4単位 | 4単位/錠 |
| 採用 | ノウリアスト錠20mg | 20mg/錠 |
| 採用 | ノクサフィル錠100mg | 100mg/錠 |
| 採用 | ノバミン錠5mg | 5mg/錠 |
| 採用 | ハーフジゴキシンKY錠0.125 | 0.125mg/錠 |
| 採用 | パーロデル錠2.5mg | 2.5mg/錠 |
| 採用 | バイアスピリン錠100mg | 100mg/錠 |

| | | |
|----|----------------------------|--|
| 採用 | ハイドレアカプセル500mg | 500mg/Cap |
| 採用 | パキロピッドパック | 1シート（淡赤色錠（4錠）及び白色錠（2錠）の2種類のフィルムコーティング錠からなる6錠の製剤） |
| 採用 | バップフォー錠10 | 10mg/錠 |
| 採用 | バラクルード錠0.5mg | 0.5mg/錠 |
| 採用 | バラシクロビル錠500mg「SPKK」 | 500mg/錠 |
| 採用 | バラシクロビル顆粒50%「SPKK」 | 500mg/g |
| 採用 | バリキサ錠450mg | 450mg/錠 |
| 採用 | バルサルタン錠80mg「サンド」 | 80mg/錠 |
| 採用 | バルモディアXR錠0.2mg | 0.2mg/錠 |
| 採用 | バルモディアXR錠0.4mg | 0.4mg/錠 |
| 採用 | バルモディア錠0.1mg | 0.1mg/錠 |
| 採用 | バレイショデンブ「ケンエー」 | 500g/個 |
| 採用 | パロキセチン錠10mg「明治」 | 10mg/錠 |
| 採用 | バンコマイシン散0.5g「OK」 | 0.5g/瓶 |
| 採用 | バントシン散20% | 200mg/包（1g） |
| 採用 | ピオグリタゾン錠15mg「武田テバ」 | 15mg/錠 |
| 採用 | ピオフェルミンR錠 | 6mg/錠 |
| 採用 | ピカルタミドOD錠80mg「DSEP」 | 80mg/錠 |
| 採用 | ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「トーワ」 | 0.75%10mL/本 |
| 採用 | ヒスロンH錠200mg | 200mg/錠 |
| 採用 | ヒスロン錠5 | 5mg/錠 |
| 採用 | ピソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」 | 0.625mg/錠 |
| 採用 | ピソプロロールフマル酸塩錠5mg「テバ」 | 5mg/錠 |
| 採用 | ビタミンB6散10%「マルイシ」 | 10%100mg/g |
| 採用 | ピタメジン配合カプセルB25 | Cap |
| 採用 | ヒダントール錠100mg | 100mg/錠 |
| 採用 | ピドキサール錠10mg | 10mg/錠 |
| 採用 | ピビアント錠20mg | 20mg/錠 |
| 採用 | ピブラマイシン錠50mg | 50mg/錠 |
| 採用 | ビムバット錠50mg | 50mg/錠 |
| 採用 | ピモベンダン錠1.25mg「TE」 | 1.25mg/錠 |
| 採用 | ピラマイド原末 | 末 |
| 採用 | ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」 | 25mg/Cap |
| 採用 | ピレチア細粒10% | 100mg/g |
| 採用 | ファモチジンD錠20mg「サワイ」 | 20mg/錠 |
| 採用 | ファロムドライシロップ小児用10% | 100mg/g |
| 採用 | ファロム錠200mg | 200mg/錠 |
| 採用 | ファンギゾンシロップ100mg/mL | （100mg/mL）24mL/瓶 |
| 採用 | フィコンパ錠2mg | 2mg/錠 |
| 採用 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 | 60mg/錠 |
| 採用 | フェノバル散10% | 100mg/g |
| 採用 | フェブキソスタット錠20mg「DSEP」 | 20mg/錠 |
| 採用 | フォシーガ錠10mg | 10mg/錠 |
| 採用 | フォシーガ錠5mg | 5mg/錠 |
| 採用 | フォリアミン錠 | 5mg/錠 |
| 採用 | ブコラム口腔用液5mg | 5mg/本 |
| 採用 | ブスコパン錠10mg | 10mg/錠 |
| 採用 | プラケニル錠200mg | 200mg/錠 |
| 採用 | プラザキサカプセル110mg | 110mg/Cap |
| 採用 | プラザキサカプセル75mg | 75mg/Cap |
| 採用 | フラジール内服錠250mg | 250mg/錠 |
| 採用 | プラノバル配合錠 | 1錠 |
| 採用 | プラバスタチンN a錠10mg「サワイ」 | 10mg/錠 |
| 採用 | フリウェル配合錠LD「あすか」 | 1錠 |
| 採用 | プリモボラン錠5mg | 5mg/錠 |
| 採用 | プリンペラン錠5 | 5mg/錠 |
| 採用 | フルイトラン錠2mg | 2mg/錠 |
| 採用 | フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」 | 100mg/Cap |
| 採用 | プレガバリンOD錠25mg「VTRS」 | 25mg/錠 |
| 採用 | プレガバリンOD錠75mg「VTRS」 | 75mg/錠 |
| 採用 | ブレディニン錠50 | 50mg/錠 |

| | | |
|----|--------------------------------|---------------|
| 採用 | プレドニゾロン散「タケダ」1% | 10mg/g |
| 採用 | プレドニゾロン錠「タケダ」5mg | 5mg/錠 |
| 採用 | プレドニゾロン錠1mg (旭化成) | 1mg/錠 |
| 採用 | プロカテロール塩酸塩シロップ5 μ g/mL「日新」 | 5 μ g/mL |
| 採用 | プログラフカプセル0.5mg | 0.5mg/Cap |
| 採用 | プログラフカプセル1mg | 1mg/Cap |
| 採用 | プロサイリン錠20 | 20 μ g/錠 |
| 採用 | フロセミド細粒4%「EMEC」 | 40mg/g |
| 採用 | フロセミド錠40mg「NIG」 | 40mg/錠 |
| 採用 | プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」 | 0.25mg/錠 |
| 採用 | プロテカジンOD錠10 | 10mg/錠 |
| 採用 | ブロナンセリン錠4mg「DSPB」 | 4mg/錠 |
| 採用 | フロベン顆粒8% | 40mg/0.5g |
| 採用 | フロリードゲル経口用2% | (20mg/g) 5g/本 |
| 採用 | フロリネフ錠0.1mg | 0.1mg/錠 |
| 採用 | ベサコリン散5% | 50mg/g |
| 採用 | ベサノイドカプセル10mg | 10mg/Cap |
| 採用 | ベタナミン錠25mg | 25mg/錠 |
| 採用 | ベタニス錠50mg | 50mg/錠 |
| 採用 | ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」 | 6mg/錠 |
| 採用 | ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」 | 0.5mg/錠 |
| 採用 | ベネクレクスタ錠100mg | 100mg/錠 |
| 採用 | ベネクレクスタ錠50mg | 50mg/錠 |
| 採用 | ペプリジル塩酸塩錠50mg「TE」 | 50mg/錠 |
| 採用 | ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」 | 10mg/錠 |
| 採用 | ヘマンジオルシロップ小児用0.375% | 120mL/瓶 |
| 採用 | ベムリディ錠25mg | 25mg/錠 |
| 採用 | ペリアクチンシロップ0.04% | 0.4mg/mL |
| 採用 | ペリアクチン錠4mg | 4mg/錠 |
| 採用 | ペリチーム配合顆粒 | 1g/包 |
| 採用 | ベルサンチン錠100mg | 100mg/錠 |
| 採用 | ベルソムラ錠15mg | 15mg/錠 |
| 採用 | ベルソムラ錠20mg | 20mg/錠 |
| 採用 | ヘルベッサールRカプセル100mg | 100mg/Cap |
| 採用 | ヘルベッサール錠30 | 30mg/錠 |
| 採用 | ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」 | 4mg/錠 |
| 採用 | ベンザリン錠5 | 5mg/錠 |
| 採用 | ベンタサ錠500mg | 500mg/錠 |
| 採用 | ボグリボース錠0.3mg「武田テバ」 | 0.3mg/錠 |
| 採用 | ホスミシンドライシロップ400 | 400mg/g |
| 採用 | ホスミシン錠500 | 500mg/錠 |
| 採用 | ポラブレジンOD錠75mg「サワイ」 | 75mg/錠 |
| 採用 | ポリコナゾール錠50mg「トーワ」 | 50mg/錠 |
| 採用 | ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 | 5g25g/個 |
| 採用 | ポリフル細粒83.3% | 500mg0.6g/包 |
| 採用 | ポルトラック原末 | 6g/包 |
| 採用 | マイスタン細粒1% | 10mg/g |
| 採用 | マイテラーゼ錠10mg | 10mg/錠 |
| 採用 | マクサルトルPD錠10mg | 10mg/錠 |
| 採用 | マグミット錠250mg | 250mg/錠 |
| 採用 | マグミット錠330mg | 330mg/錠 |
| 採用 | ミオナール錠50mg | 50mg/錠 |
| 採用 | ミグシス錠5mg | 5mg/錠 |
| 採用 | ミニリンメルトOD錠120 μ g | 120 μ g/錠 |
| 採用 | ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「トーワ」 | 50mg/錠 |
| 採用 | ミノマイシン顆粒2% | 20mg/g |
| 採用 | ミヤBM細粒 | 40mg/g |
| 採用 | ミヤBM錠 | 20mg/錠 |
| 採用 | ミラベックスLA錠0.375mg | 0.375mg/錠 |
| 採用 | ミラベックスLA錠1.5mg | 1.5mg/錠 |
| 採用 | メイアクトMS小児用細粒10% | 100mg/g |
| 採用 | メイラックス錠1mg | 1mg/錠 |

| | | |
|----|------------------------------|--------------------|
| 採用 | メキシチールカプセル100mg | 100mg/Cap |
| 採用 | メサベイン錠5mg | 5mg/錠 |
| 採用 | メジコン散10% | 100mg/g |
| 採用 | メジコン配合シロップ | 500mL/瓶 |
| 採用 | メスチノン錠60mg | 60mg/錠 |
| 採用 | メチコパール細粒0.1% | 500 μ g/0.5g/包 |
| 採用 | メチコパール錠500 μ g | 500 μ g/錠 |
| 採用 | メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」 | 0.125mg/錠 |
| 採用 | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」 | 250mg/錠 |
| 採用 | メトリジン錠2mg | 2mg/錠 |
| 採用 | メプチンドライシロップ0.005% | 50 μ g/g |
| 採用 | メプチン錠50 μ g | 50 μ g/錠 |
| 採用 | メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」 | 5mg/錠 |
| 採用 | メルカゾール錠5mg | 5mg/錠 |
| 採用 | モサブリドクエン酸塩錠5mg「日医工」 | 5mg/錠 |
| 採用 | モビコール配合内用剤LD | 6.8523g/包 |
| 採用 | モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」 | 10mg/錠 |
| 採用 | ユベラNカプセル100mg | 100mg/Cap |
| 採用 | ユベラ錠50mg | 50mg/錠 |
| 採用 | ユリノーム錠50mg | 50mg/錠 |
| 採用 | ヨウ化カリウム「ホエイ」 | 未 |
| 採用 | ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」 | 50mg/丸 |
| 採用 | ラクツロースシロップ65%「タカタ」 | 65% 650mg/mL |
| 採用 | ラゲブリオカプセル200mg | 200mg/Cap |
| 採用 | ラコールNF配合経腸用半固形剤 | 300g/バッグ |
| 採用 | ラストットSカプセル25mg | 25mg/Cap |
| 採用 | ラペブラゾールNa錠10mg「杏林」 | 10mg/錠 |
| 採用 | ラミクタール錠25mg | 25mg/錠 |
| 採用 | ラミシール錠125mg | 125mg/錠 |
| 採用 | ラメルテオン錠8mg「武田テバ」 | 8mg/錠 |
| 採用 | ランドセン細粒0.1% | 1mg/g |
| 採用 | ランドセン錠0.5mg | 0.5mg/錠 |
| 採用 | リアルダ錠1200mg | 1200mg/錠 |
| 採用 | リーゼ錠5mg | 5mg/錠 |
| 採用 | リーバクト配合顆粒 | 4.15g/包 |
| 採用 | リウマトレックスカプセル2mg | 2mg/Cap |
| 採用 | リオナ錠250mg | 250mg/錠 |
| 採用 | リクシアナOD錠30mg | 30mg/錠 |
| 採用 | リザベンカプセル100mg | 100mg/Cap |
| 採用 | リスバダールOD錠1mg | 1mg/錠 |
| 採用 | リスバダール細粒1% | 10mg/g |
| 採用 | リスバダール内用液1mg/mL | 0.5mL/包 |
| 採用 | リスバダール内用液1mg/mL | 1mL/包 |
| 採用 | リスバダール内用液1mg/mL | 2mL/包 |
| 採用 | リスマー錠2mg | 2mg/錠 |
| 採用 | リズミック錠10mg | 10mg/錠 |
| 採用 | リスモダンR錠150mg | 150mg/錠 |
| 採用 | リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」 | 10mg/錠 |
| 採用 | リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」 | 15mg/錠 |
| 採用 | リパクレオンカプセル150mg | 150mg/Cap |
| 採用 | リファンピシカプセル150mg「サンド」 | 150mg/Cap |
| 採用 | リフキシマ錠200mg | 200mg/錠 |
| 採用 | リフレックス錠15mg | 15mg/錠 |
| 採用 | リベルサス錠3mg | 3mg/錠 |
| 採用 | リマチル錠100mg | 100mg/錠 |
| 採用 | リマプロスタアルファデクス錠5 μ g「サワイ」 | 5 μ g/錠 |
| 採用 | リルゾール錠50mg「AA」 | 50mg/錠 |
| 採用 | リンゼス錠0.25mg | 0.25mg/錠 |
| 採用 | リンデロン散0.1% | 1mg/g |
| 採用 | ルバフィン錠10mg | 10mg/錠 |
| 採用 | ルリッド錠150 | 150mg/錠 |
| 採用 | レキササルティOD錠0.5mg | 0.5mg/錠 |

| | | |
|-------|--------------------------|-------------------------------|
| 採用 | レキソタン錠2 | 2mg/錠 |
| 採用 | レキップCR錠2mg | 2mg/錠 |
| 採用 | レクサプロ錠10mg | 10mg/錠 |
| 採用 | レクチゾール錠25mg | 25mg/錠 |
| 採用 | レスタミンコーワ錠10mg | 10mg/錠 |
| 採用 | レスビア静注・経口液60mg | (カフェインクエン酸塩として) 60mg3mL/V |
| 採用 | レトロゾール錠2.5mg「サンド」 | 2.5mg/錠 |
| 採用 | レナデックス錠4mg | 4mg/錠 |
| 採用 | レナリドミドカプセル5mg「BMSH」 | 5mg/Cap |
| 採用 | レニベース錠5 | 5mg/錠 |
| 採用 | レバグリニド錠0.25mg「サワイ」 | 0.25mg/錠 |
| 採用 | レバミピド錠100mg「NP」 | 100mg/錠 |
| 採用 | レボセチリジン塩酸塩錠5mg | 5mg/錠 |
| 採用 | レボトミン散10% | 100mg/g |
| 採用 | レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 | 500mg/錠 |
| 採用 | レボレード錠12.5mg | 12.5mg/錠 |
| 採用 | レルミナ錠40mg | 40mg/錠 |
| 採用 | ロキソニン細粒10% | 100mg/g |
| 採用 | ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」 | 60mg/錠 |
| 採用 | ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 | 2.5mg/錠 |
| 採用 | ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」 | 1mg/Cap |
| 採用 | ワーファリン錠1mg | 1mg/錠 |
| 採用 | ワーファリン顆粒0.2% | 2mg/g |
| 採用 | ワイドシリン細粒20% | 200mg/g |
| 採用 | ワイパックス錠1.0 | 1mg/錠 |
| 採用 | ワソラン錠40mg | 40mg/錠 |
| 採用 | 塩化ナトリウム「オーツカ」 | 未 |
| 採用 | 塩酸アムプロキシソール錠15mg「杏林」 | 15mg/錠 |
| 採用 | 酢酸亜鉛錠50mg「ノーベル」 | 50mg/錠 |
| 採用 | 単シロップシオエ | mL |
| 採用 | 炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」 | 250mg/錠 |
| 採用 | 炭酸リチウム錠200mg「大正」 | 200mg/錠 |
| 採用 | 炭酸水素ナトリウムシオエ | 未 |
| 採用 | 調剤用バンビタン末 | 未 |
| 採用 | 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 | 500mg/錠 |
| 採用 | 乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末 | 細粒 |
| 採用 | 乳糖「ホエイ」 | EFC(倍散用結晶) |
| 採用(外) | 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | (g) |
| 採用(外) | MS温シップ「タイホウ」 | 10cm×14cm(20g)/枚(1袋:5枚) |
| 採用(外) | MS冷シップ「タイホウ」 | 14cm×20cm(40g)/枚(1袋:5枚) |
| 採用(外) | SPトローチ0.25mg「明治」 | 0.25mg/錠 |
| 採用(外) | アイファガン点眼液0.1% | (1mg/mL) 5mL/本 |
| 採用(外) | アクアチムローション1% | (10mg/mL) 20mL/瓶 |
| 採用(外) | アクトシン軟膏3% | (30mg/g) 30g/本 |
| 採用(外) | アズノールうがい液4% | (40mg/mL) 5mL/本 |
| 採用(外) | アズノール軟膏0.033% | 20g/本, (g) |
| 採用(外) | アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「シオエ」 | 200mg/個 |
| 採用(外) | アドエア100ディスカス60吸入用 | 60プリスター/キット |
| 採用(外) | アドエア50エアゾール120吸入用 | 120回噴霧/缶 |
| 採用(外) | アドフィードパップ40mg | 40mg12g/枚(10cm×14cm/枚)(1袋:7枚) |
| 採用(外) | アトラント外用液1% | (10mg/mL) 10mL/本 |
| 採用(外) | アノーロエリプタ7吸入用 | 7吸入/キット |
| 採用(外) | アフタッチ口腔用貼付剤25μg | 25μg/錠 |
| 採用(外) | アラセナーA軟膏3% | (30mg/g) 2g/本 |
| 採用(外) | アルビニー坐剤100 | 100mg/個 |
| 採用(外) | アルメタ軟膏 | (1mg/g) 5g/本 |
| 採用(外) | アンベック坐剤10mg | 10mg/個 |
| 採用(外) | アンベック坐剤30mg | 30mg/個 |
| 採用(外) | イオウ・カンフルローション「東豊」 | 500mL/瓶 |
| 採用(外) | イソジンシュガーバスタ軟膏 | 100g/本 |
| 採用(外) | イナビル吸入粉末剤20mg | 20mg/キット |
| 採用(外) | インターール吸入液1% | 20mg2mL/管 |

| | | |
|--------|---------------------------------|---|
| 採用 (外) | インテバンクリーム1% | (10mg/g) 50g/本 |
| 採用 (外) | ウルティプロ吸入用カプセル | 1Cap |
| 採用 (外) | エキザルベ | 5g/本 |
| 採用 (外) | エコリシン眼軟膏 | 3.5g/本 |
| 採用 (外) | エナジア吸入用カプセル高用量(7Cap/枚) | 1Cap |
| 採用 (外) | エピナスチン塩酸塩LX点眼液0.1%「SEC」 | 0.1%5mL/本 |
| 採用 (外) | エムラクリーム | 5g/本 |
| 採用 (外) | オイラックスクリーム10% | (100mg/g) 10g/本 |
| 採用 (外) | オキサロール軟膏25 μ g/g | (25 μ g/g) 10g/本 |
| 採用 (外) | オキナゾール錠600mg | 600mg/錠 |
| 採用 (外) | カデックス軟膏0.9% | 40g |
| 採用 (外) | キサラタン点眼液0.005% | 0.005%2.5mL/本 |
| 採用 (外) | キューバル100エアゾール | 15mg8.7g/缶(1回の噴霧主薬量: 100 μ g) |
| 採用 (外) | グラナテック点眼液0.4% | 0.4%5mL/本 |
| 採用 (外) | クラビット点眼液1.5% | (15mg/mL) 5mL/本 |
| 採用 (外) | クロトリマゾール錠100mg「F」 | 100mg/錠 |
| 採用 (外) | クロマイ錠100mg | 100mg/錠 |
| 採用 (外) | ゲーベンクリーム1% | 1%50g/本 (10mg/g) |
| 採用 (外) | ケトプロフェンテープ40mg「SN」 | 40mg 1.4g/枚(10cm \times 14cm/枚)(1袋: 7枚) |
| 採用 (外) | ゲンタシン軟膏0.1% | 10g/本 |
| 採用 (外) | コールタイジン点鼻液 | 15mL/本 |
| 採用 (外) | コソプトミニ配合点眼液 | 0.4mL/個 |
| 採用 (外) | コソプト配合点眼液 | 5mL/本 |
| 採用 (外) | サイプレジン1%点眼液 | (10mg/mL) 10mL/本 |
| 採用 (外) | ザラカム配合点眼液 | 2.5mL/本 |
| 採用 (外) | サリベートエアゾール | 50g/缶 |
| 採用 (外) | サルタノールインヘラー100 μ g | 0.16%13.5mL/本 |
| 採用 (外) | サレックス軟膏0.05% | 0.05%5g/本 |
| 採用 (外) | サンドールP点眼液 | 5mL/本 |
| 採用 (外) | サンピロ点眼液2% | (20mg/mL) 5mL/瓶 |
| 採用 (外) | ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」 | 500mg \cdot 10mL/本 |
| 採用 (外) | ジクアスLX点眼液3% | 3%5mL/本 |
| 採用 (外) | ジクトルテープ75mg | 75mg/枚/袋 |
| 採用 (外) | ジクロフェナクNa \cdot PF点眼液0.1%「日点」 | (1mg/mL) 5mL/本 |
| 採用 (外) | ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」 | 25mg/個 |
| 採用 (外) | ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」 | 50mg/個 |
| 採用 (外) | ジフルブレドナート軟膏0.05%「イワキ」 | (0.5mg/g) 5g/本 |
| 採用 (外) | スピオルトレスピマット28吸入 | 28吸入/キット |
| 採用 (外) | スピリーバ2.5 μ gレスピマット60吸入 | 2.5 μ g60吸入/キット |
| 採用 (外) | セクターローション3% | 3%50mL/本 |
| 採用 (外) | セルタッチパップ70 | 70mg14.0g/枚(10cm \times 14cm/枚)(1袋: 7枚) |
| 採用 (外) | ゾピラックス眼軟膏3% | (30mg/g) 5g/本 |
| 採用 (外) | ダイアアップ坐剤4 | 4mg/個 |
| 採用 (外) | ダイアアップ坐剤6 | 6mg/個 |
| 採用 (外) | タクロリムス軟膏0.1%「PP」 | (1mg/g) 5g/本 |
| 採用 (外) | タリビッド眼軟膏0.3% | (3mg/g) 3.5g/本 |
| 採用 (外) | タリビッド耳科用液0.3% | (3mg/mL) 5mL/本 |
| 採用 (外) | チモプトールXE点眼液0.5% | (5mg/mL) 2.5mL/瓶 |
| 採用 (外) | チモプトール点眼液0.5% | (5mg/mL) 5mL/瓶 |
| 採用 (外) | ディフェリンゲル0.1% | (1mg/g) 15g/本 |
| 採用 (外) | デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」 | 1mg/g |
| 採用 (外) | テラ \cdot コートリル軟膏 | 5g/本 |
| 採用 (外) | テリルジー100エリプタ14吸入用 | 14吸入/キット |
| 採用 (外) | テルピナフィン塩酸塩クリーム1%「イワキ」 | 1%10g/本 |
| 採用 (外) | デルモベートクリーム0.05% | (0.5mg/g) 5g/本 |
| 採用 (外) | デルモベートスカルプローション0.05% | (0.5mg/g) 10g/本 |
| 採用 (外) | デルモベート軟膏0.05% | (0.5mg/g) 5g/本 |
| 採用 (外) | トプシムローション0.05% | (0.5mg/g) 10g/本 |
| 採用 (外) | トブラシン点眼液0.3% | (3mg/mL) 5mL/本 |
| 採用 (外) | トルソプト点眼液1% | (10mg/mL) 5mL/瓶 |
| 採用 (外) | ナウゼリン坐剤10 | 10mg/個 |
| 採用 (外) | ナウゼリン坐剤60 | 60mg/個 |

| | | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|
| 採用 (外) | ナサニール点鼻液0.2% | 10mg5mL/瓶 |
| 採用 (外) | ニコチネルTTS10 | (17.5mg) 10cm ² /枚 |
| 採用 (外) | ニコチネルTTS20 | (35mg) 20cm ² /枚 |
| 採用 (外) | ニコチネルTTS30 | (52.5mg) 30cm ² /枚 |
| 採用 (外) | ニゾラークリーム2% | (20mg/g) 10g/本 |
| 採用 (外) | ニゾラーローション2% | (20mg/g) 10g/本 |
| 採用 (外) | ネオシネジンコーワ5%点眼液 | (50mg/mL) 10mL/本 |
| 採用 (外) | ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% | (1mg/g) 10g/本 |
| 採用 (外) | ネリゾナ軟膏0.1% | (1mg/g) 10g/本 |
| 採用 (外) | ノルスバンテープ5mg | 5mg/枚 |
| 採用 (外) | バクトロバン鼻腔用軟膏2% | (20mg/g) 3g/本 |
| 採用 (外) | バルミコート吸入液0.25mg | 0.25mg2mL/管 |
| 採用 (外) | ハルロピテープ24mg | 24mg/枚 |
| 採用 (外) | ハルロピテープ32mg | 32mg/枚 |
| 採用 (外) | ハルロピテープ8mg | 8mg/枚 |
| 採用 (外) | ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」 | (1mg/mL) 5mL/瓶 |
| 採用 (外) | ヒアレインミニ点眼液0.3% | (3mg/mL) 0.4mL/本 |
| 採用 (外) | ピソノテープ4mg | 4mg/枚 |
| 採用 (外) | ビレーズトリエアロスフィア56吸入 | 56吸入/キット |
| 採用 (外) | フィブラストスプレー500 | 500 μ g/瓶(溶解液付) |
| 採用 (外) | フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ1mg「テイコク」 | 1mg/枚 |
| 採用 (外) | フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ2mg「テイコク」 | 2mg/枚 |
| 採用 (外) | フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ4mg「テイコク」 | 4mg/枚 |
| 採用 (外) | フェントステープ0.5mg | 0.5mg/枚 |
| 採用 (外) | フジジンレオ軟膏2% | (20mg/g) 10g/本 |
| 採用 (外) | ブデホル吸入粉末剤60吸入「ニプロ」 | 60吸入/キット |
| 採用 (外) | フラジール錠250mg | 250mg/錠 |
| 採用 (外) | プラスチベース | g |
| 採用 (外) | プリピナ液0.05% | 0.5mg/mL |
| 採用 (外) | プリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」 | (10mg/mL) 5mL/本 |
| 採用 (外) | フルタイド50 μ gエアゾール120吸入用 | 9.72mg10.6g/缶(1吸入量:50 μ g) |
| 採用 (外) | フルティフォーム125エアゾール56吸入用 | 56吸入/瓶 |
| 採用 (外) | フルメトロン点眼液0.02% | (0.2mg/mL) 5mL/本 |
| 採用 (外) | フルメトロン点眼液0.1% | (1mg/mL) 5mL/本 |
| 採用 (外) | プレグランディン腔坐剤1mg | 1mg/個 |
| 採用 (外) | フロジン外用液5% | (50mg/mL) 30mL/本 |
| 採用 (外) | プロスタンディン軟膏0.003% | (30 μ g/g) 30g/本 |
| 採用 (外) | プロトピック軟膏0.03%小児用 | (0.3mg/g) 5g/本 |
| 採用 (外) | プロベト | 100g/本, (g) |
| 採用 (外) | プロムフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」 | (1mg/mL) 5mL/本 |
| 採用 (外) | プロムヘキシリン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」 | 0.2%45mL/本 |
| 採用 (外) | ベストロン点眼用0.5% | (25mg5mL/瓶(溶解後の液として)) |
| 採用 (外) | ベネトリン吸入液0.5% | (5mg/mL) 30mL/瓶 |
| 採用 (外) | ベノキシル点眼液0.4% | (4mg/mL) 10mL/本 |
| 採用 (外) | ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」 | 3.0mg/g 100g/本 |
| 採用 (外) | ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 | 3.0mg/g 25g/本 |
| 採用 (外) | ペンタサ坐剤1g | 1g/個 |
| 採用 (外) | ポアラ軟膏0.12% | (1.2mg/g) 5g/本 |
| 採用 (外) | ホーリンV腔用錠1mg | 1mg/錠 |
| 採用 (外) | ホクナリンテープ0.5mg | 0.5mg/枚 |
| 採用 (外) | ホクナリンテープ2mg | 2mg/枚 |
| 採用 (外) | ポビドンヨードガーグル7%「ケンエー」 | 7%30mL/本 |
| 採用 (外) | ポラザG軟膏 | 2.4g/個 |
| 採用 (外) | ポルタレンゲル1% | (10mg/g) 50g/本 |
| 採用 (外) | マイザークリーム0.05% | 5g/本 |
| 採用 (外) | マイトマイシン眼科外用液用2mg | 2mg/瓶 |
| 採用 (外) | マクロゴール軟膏「ヨシダ」 | 500g/本 |
| 採用 (外) | ミオコールスプレー0.3mg | (6.5mg/g) 7.2g (100回用) /缶 |
| 採用 (外) | ミケランLA点眼液2% | (20mg/mL) 2.5mL/本 |
| 採用 (外) | ミドリンM点眼液0.4% | 5mL/本 |
| 採用 (外) | ムコフィリン吸入液20% | 352.4mg2mL/包 |
| 採用 (外) | メサデルム軟膏0.1% | 0.1%5g/本 |

| | | |
|--------|----------------------------|---|
| 採用 (外) | メプチンエア-10 μ g吸入100回 | 143 μ g/g 5mL/キット(1回噴霧中10 μ g) |
| 採用 (外) | メプチン吸入液ユニット0.5mL | 100 μ g/mL (0.5mL/個) |
| 採用 (外) | モイゼルト軟膏1% | (10mg/g) 10g/本 |
| 採用 (外) | モメタゾン点鼻液50 μ g「杏林」56噴霧 | 5mg10g/瓶 |
| 採用 (外) | ヤクバンテープ20mg | 20mg0.84g/枚(7cm \times 10cm/枚)(1袋:7枚) |
| 採用 (外) | リドメックスコーワローション0.3% | (3mg/g) 10g/本 |
| 採用 (外) | リレンザ | (5mg/プリスター) 4プリスター/枚 |
| 採用 (外) | リンデロン-VG軟膏0.12% | 5g/本 |
| 採用 (外) | リンデロン-Vローション | (1.2mg/mL) 10mL/瓶 |
| 採用 (外) | リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% | (1mg/mL) 5mL/瓶 |
| 採用 (外) | ルリコナゾール軟膏1%「イワキ」 | 10g/本 |
| 採用 (外) | レスタミンコーワクリーム1% | 1%500g/瓶 |
| 採用 (外) | レルベア100エリプタ14吸入用 | 14吸入/キット |
| 採用 (外) | レルベア200エリプタ14吸入用 | 14吸入/キット |
| 採用 (外) | ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」 | 100mg2g/枚(10cm \times 14cm/枚)(1袋:7枚) |
| 採用 (外) | ロコイド軟膏0.1% | 0.1%5g/本 |
| 採用 (外) | ワコビタール坐剤100 | 100mg/個 |
| 採用 (外) | ワコビタール坐剤50 | 50mg/個 |
| 採用 (外) | 亜鉛華(10%)単軟膏シオエ | g |
| 採用 (外) | 眼・耳科用リンデロンA軟膏 | 5g/本 |
| 採用 (外) | 吸水クリーム「ニコウ」 | g |
| 採用 (外) | 強力ポステリザン(軟膏) | 2g/個 |
| 採用 (外) | 小児用レルベア50エリプタ14吸入用 | 14吸入/キット |
| 採用 (外) | 硝酸イソソルピドテープ40mg「テイコク」 | 40mg/枚 |
| 採用 (外) | 新レシカルボン坐剤 | 2.6g/個 |
| 採用 (外) | 人工涙液マイティア点眼液 | 5mL/瓶 |
| 採用 (外) | 日点アトロピン点眼液1% | (10mg/mL) 5mL/瓶 |
| 採用 (外) | 尿素クリーム20%「SUN」 | 20%25g/本 |
| 採用 (注) | KCL注10mEqキット「テルモ」 | 0.7455g10mL/キット |
| 採用 (注) | アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 | 500mL/袋 |
| 採用 (注) | アイリーア8mg硝子体内注射液114.3mg/mL | 0.263mL/瓶 |
| 採用 (注) | アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL | 2mg0.05mL/筒 |
| 採用 (注) | アウイクリ注フレックスタッチ総量300単位 | 300単位/キット |
| 採用 (注) | アキネトン注射液5mg | 5mg1mL/管 |
| 採用 (注) | アクチバシン注2400万 | 2400万IU/瓶(溶解液付) |
| 採用 (注) | アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター | 162mg0.9mL/キット |
| 採用 (注) | アクテムラ点滴静注用400mg | 400mg/瓶 |
| 採用 (注) | アクテムラ点滴静注用80mg | 80mg/瓶 |
| 採用 (注) | アコアラン静注用1800 | 1800IU/瓶(溶解液付) |
| 採用 (注) | アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」 | 250mg/瓶 |
| 採用 (注) | アセリオ静注液1000mgバッグ | 1,000mg100mL/袋 |
| 採用 (注) | アタラックス-P注射液(25mg/ml) | 25mg1mL/管 |
| 採用 (注) | アデホス-Lコーワ注20mg | 20mg2mL/管 |
| 採用 (注) | アドトラザ皮下注300mgペン | 300mg2mL/キット |
| 採用 (注) | アドナ注(静脈用)50mg | 50mg10mL/管 |
| 採用 (注) | アドナ注10mg | 10mg2mL/管 |
| 採用 (注) | アトニン-O注5単位 | 5単位1mL/管 |
| 採用 (注) | アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 | 1mg1mL/筒 |
| 採用 (注) | アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」 | 1mL/筒 |
| 採用 (注) | アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」 | 0.5mg1mL/管 |
| 採用 (注) | アネメトロ点滴静注液500mg | 500mg/100mL/瓶 |
| 採用 (注) | アネレム静注用50mg | 50mg/瓶 |
| 採用 (注) | アバスチン点滴静注用100mg/4mL | 100mg4mL/瓶 |
| 採用 (注) | アバスチン点滴静注用400mg/16mL | 400mg16mL/瓶 |
| 採用 (注) | アブラキサ点滴静注用100mg | 100mg/瓶 |
| 採用 (注) | アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」 | 150mg3mL/管 |
| 採用 (注) | アミカシン硫酸塩注射液200mg「明治」 | 200mg/管 |
| 採用 (注) | アミサリン注200mg | 200mg2mL/管 |
| 採用 (注) | アミノレバン点滴静注 | 500mL/袋 |
| 採用 (注) | アミバレン輸液 | 200mL/袋 |
| 採用 (注) | アムビゾーム点滴静注用50mg | 50mg/瓶 |
| 採用 (注) | アリナミンF10注 | 10mg2mL/管 |

| | | |
|--------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 採用 (注) | アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」 | 10mg2mL/管 |
| 採用 (注) | アルツディスボ関節注25mg | 25mg2.5mL/筒 |
| 採用 (注) | アルプロスタジルアルファデクス注射用20 μ g「タカタ」 | 20 μ g/瓶 |
| 採用 (注) | アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500 μ g「タカタ」 | 500 μ g/瓶 |
| 採用 (注) | アレンドロン酸点滴静注バッグ900 μ g「HK」 | 900 μ g100mL/袋 |
| 採用 (注) | アロカリス点滴静注235mg | 235mg10mL/瓶 |
| 採用 (注) | アンサー皮下注20 μ g | 20 μ g1mL/管(D-アラビノース換算糖含量として) |
| 採用 (注) | アンチレクス静注10mg | 10mg1mL/管 |
| 採用 (注) | アンベック注200mg | 200mg5mL/管 |
| 採用 (注) | イーケプラ点滴静注500mg | 500mg5mL/瓶 |
| 採用 (注) | イダマイシン静注用5mg | 5mg/瓶 |
| 採用 (注) | イノバン注0.3%シリンジ | 150mg50mL/筒 |
| 採用 (注) | イブグリース皮下注250mgオートインジェクター | 2mL/本 |
| 採用 (注) | イベニティ皮下注105mgシリンジ | 105mg1.17mL/筒 |
| 採用 (注) | イミグランキッド皮下注3mg | 0.5mL/筒 |
| 採用 (注) | イミフィンジ点滴静注500mg | 500mg/瓶 |
| 採用 (注) | イムノブラダー-勝注用80mg | 80mg/瓶(溶解液付) |
| 採用 (注) | イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーワ」 | 100mg5mL/瓶 |
| 採用 (注) | イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーワ」 | 40mg2mL/瓶 |
| 採用 (注) | イルミア皮下注100mgシリンジ | 100mg/1mL/筒 |
| 採用 (注) | インスリングルルギンBS注ミリオペン「リリー」 | 300単位3mL/キット |
| 採用 (注) | インスリンリスプロBS注ソロスターHU「サノフィ」 | 300単位3mL/キット |
| 採用 (注) | インダシン静注用1mg | 1mg/瓶 |
| 採用 (注) | インデラル注射液2mg | 2mg2mL/管 |
| 採用 (注) | イントラリボス輸液20% | 20%100mL/袋 |
| 採用 (注) | インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」 | 100mg/瓶 |
| 採用 (注) | ヴィーンF輸液 | 500mL/袋 |
| 採用 (注) | ウロナーゼ静注用6万単位 | 60,000単位/瓶 |
| 採用 (注) | ウロミテキサン注400mg | 400mg4mL/管 |
| 採用 (注) | エクザール注射用10mg | 10mg/瓶 |
| 採用 (注) | エクストラニール腹膜透析液 | シングルバッグ・機器専用1.5L1袋 |
| 採用 (注) | エクストラニール腹膜透析液 | UVツインバッグ1.5L1袋(排液用バッグ付) |
| 採用 (注) | エスポー注射液750 | 750IU0.5mL/管 |
| 採用 (注) | エスポー皮下用24000シリンジ | 24,000IU0.5mL/筒 |
| 採用 (注) | エスラックス静注50mg/5.0mL | 50mg5mL/瓶 |
| 採用 (注) | エダラボン点滴静注液バッグ30mg「NP」 | 30mg100mL/袋 |
| 採用 (注) | エトボシド点滴静注液100mg「サンド」 | 100mg5mL/瓶 |
| 採用 (注) | エナルモンデポー筋注250mg | 250mg1mL/管 |
| 採用 (注) | エヌジェンラ皮下注24mgペン | 24mg1.2mL/キット |
| 採用 (注) | エヌジェンラ皮下注60mgペン | 60mg1.2mL/キット |
| 採用 (注) | エバシェルド筋注セット | 各150mg1.5mL/瓶 |
| 採用 (注) | エピベン注射液0.3mg | 2mg2mL/本 (1回注射量0.3mL) |
| 採用 (注) | エピルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」 | 10mg/瓶 |
| 採用 (注) | エピルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」 | 50mg/瓶 |
| 採用 (注) | エホチール注10mg | 10mg1mL/管 |
| 採用 (注) | エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター | 120mg1mL/シリンジ |
| 採用 (注) | エルシトニン注40単位 | 40エルカトニン単位1mL/管 |
| 採用 (注) | エルネオパNF1号輸液 | 1000mL/袋 |
| 採用 (注) | エルネオパNF1号輸液 | 1500mL/袋 |
| 採用 (注) | エルネオパNF2号輸液 | 1000mL/袋 |
| 採用 (注) | エルネオパNF2号輸液 | 1500mL/袋 |
| 採用 (注) | エンタイビオ点滴静注300mg | 300mg/瓶 |
| 採用 (注) | エンタイビオ皮下注108mgペン | 108mg/ペン |
| 採用 (注) | オーツカMV注 | 瓶・4mL管/組 |
| 採用 (注) | オキサリプラチン注100mg/20mL「NK」 | 100mg/瓶 |
| 採用 (注) | オキサリプラチン注200mg/40mL「NK」 | 200mg/瓶 |
| 採用 (注) | オキサリプラチン注50mg/10mL「NK」 | 50mg/瓶 |
| 採用 (注) | オキシコドン注射液10mg「第一三共」 | 10mg1mL/管 |
| 採用 (注) | オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μ g「サンド」 | 100 μ g1mL/管 |
| 採用 (注) | オザグレルNa静注液40mg「日医工」 | 40mg4mL/管 |
| 採用 (注) | オニバイド点滴静注43mg | 43mg10mL/瓶 |
| 採用 (注) | オノアクト点滴静注用50mg | 50mg/瓶 |

| | | |
|--------|-----------------------------|----------------------------|
| 採用 (注) | オピソート注射用0.1g | 0.1g/管 |
| 採用 (注) | オブジーボ点滴静注120mg/12mL | 120mg12mL/瓶 |
| 採用 (注) | オブジーボ点滴静注240mg/24mL | 240mg24mL/瓶 |
| 採用 (注) | オメブラゾール注射用20mg「日医工」 | 20mg/瓶 |
| 採用 (注) | オルガドロン注射液3.8mg | 5mg1mL/管 (デキサメタゾンとして3.8mg) |
| 採用 (注) | オンコピン注射用1mg | 1mg/瓶 |
| 採用 (注) | オンデキサ静注用200mg | 200mg/瓶 |
| 採用 (注) | ガザイバ点滴静注1000mg | 1000mg40mL/瓶 |
| 採用 (注) | カドサイラ点滴静注用100mg | 100mg/瓶 |
| 採用 (注) | カドサイラ点滴静注用160mg | 160mg/瓶 |
| 採用 (注) | ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」 | 500mg/瓶 |
| 採用 (注) | カルチコール注射液8.5%5mL | (85mg/mL) 5mL/管 |
| 採用 (注) | カルベニン点滴用0.5g | 500mg/瓶 |
| 採用 (注) | カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」 | 150mg15mL/瓶 |
| 採用 (注) | カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」 | 450mg45mL/瓶 |
| 採用 (注) | カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」 | 50mg5mL/瓶 |
| 採用 (注) | カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」 | 200mg/瓶 |
| 採用 (注) | キイトルーダ点滴静注100mg | 100mg4mL/瓶 |
| 採用 (注) | キロサイドN注1g | 1g50mL/瓶 |
| 採用 (注) | キロサイド注200mg | 200mg10mL/管 |
| 採用 (注) | キロサイド注20mg | 20mg1mL/管 |
| 採用 (注) | キロサイド注60mg | 60mg3mL/管 |
| 採用 (注) | グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」 | 3mg100mL/袋 |
| 採用 (注) | クリアクター静注用40万 | 40万IU/瓶 |
| 採用 (注) | グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」 | 200mL/袋 |
| 採用 (注) | クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」 | 600mg4mL/管 |
| 採用 (注) | グルアセト35注 | 500mL/袋 |
| 採用 (注) | クレキササン皮下注キット2000IU | 2000I.U.(抗第Xa因子活性)0.2mL/筒 |
| 採用 (注) | グロウジェクト皮下注12mg | 12mg/筒 |
| 採用 (注) | ケイセントラ静注用1000 | 1000I.U./瓶(溶解液付) |
| 採用 (注) | ケイセントラ静注用500 | 500I.U./瓶(溶解液付) |
| 採用 (注) | ケイツーN静注10mg | 10mg2mL/管 |
| 採用 (注) | ケタラール静注用200mg | 200mg20mL/瓶 |
| 採用 (注) | ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL | 40mg1mL/瓶 |
| 採用 (注) | ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL | 50mg5mL/瓶 |
| 採用 (注) | ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」 | 1g/瓶 |
| 採用 (注) | ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」 | 200mg/瓶 |
| 採用 (注) | ゲンタシン注60 | 60mg1.5mL/管 |
| 採用 (注) | コアベータ静注用12.5mg | 12.5mg/瓶 |
| 採用 (注) | コートロシン注射用0.25mg | 0.25mg/管(溶解液付) |
| 採用 (注) | コセンテックス皮下注150mgペン | 150mg1mL/キット |
| 採用 (注) | ゴナックス皮下注用120mg | 120mg/瓶 (溶解液付き) |
| 採用 (注) | ゴナックス皮下注用240mg | 240mg/瓶 (溶解液付き) |
| 採用 (注) | ゴナックス皮下注用80mg | 80mg/瓶 (溶解液付き) |
| 採用 (注) | コントミン筋注10mg | 10mg2mL/管 |
| 採用 (注) | コンファクトF静注用500 | 500単位/瓶(溶解液付) |
| 採用 (注) | サイラムザ点滴静注液100mg | 100mg10mL/瓶 |
| 採用 (注) | サイラムザ点滴静注液500mg | 500mg50mL/瓶 |
| 採用 (注) | サイレース静注2mg | 2mg1mL/管 |
| 採用 (注) | サビーン点滴静注用500mg | 500mg/瓶 |
| 採用 (注) | サムタス点滴静注用8mg | 8mg/瓶 |
| 採用 (注) | サンリズム注射液50 | 50mg5mL/管 |
| 採用 (注) | ジーラスタ皮下注3.6mg | 3.6mg0.36mL/筒 |
| 採用 (注) | ジーラスタ皮下注3.6mgボディーポッド | 3.6mg0.36mL/キット |
| 採用 (注) | ジーラスタ皮下注3.6mgボディーポッド | 3.6mg0.36mL/キット |
| 採用 (注) | ジェントロピンゴークイック注用12mg | 12mg/キット |
| 採用 (注) | ジェントロピンゴークイック注用5.3mg | 5.3mg/キット |
| 採用 (注) | ジギラノゲン注0.4mg | 0.4mg2mL/管 |
| 採用 (注) | シザナリン配合点滴静注液 | 2mL/管 |
| 採用 (注) | シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 | 10mg20mL/瓶 |
| 採用 (注) | シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」 | 25mg50mL/瓶 |
| 採用 (注) | シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」 | 50mg100mL/瓶 |

| | | |
|--------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 採用 (注) | ジスロマック点滴静注用500mg | 500mg/瓶 |
| 採用 (注) | シナジス筋注液100mg | 100mg1.0mL/瓶 |
| 採用 (注) | シナジス筋注液50mg | 50mg0.5mL/瓶 |
| 採用 (注) | シンビット静注用50mg | 50mg/瓶 |
| 採用 (注) | スガマデクス静注液200mg「マルイシ」 | 200mg2mL/瓶 |
| 採用 (注) | スキサメトニウム注40「マルイシ」 | 40mg2mL/管 |
| 採用 (注) | スキリージ皮下注150mgシリンジ1mL | 150mg/1mL/筒 |
| 採用 (注) | ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ | 240万単位/筒 |
| 採用 (注) | ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明治」 | 1g/瓶 |
| 採用 (注) | ズファジラン筋注5mg | 5mg1mL/管 |
| 採用 (注) | スミフェロン注DS300万IU | 300万I.U.1mL/筒 |
| 採用 (注) | スミフェロン注DS600万IU | 600万I.U.1mL/筒 |
| 採用 (注) | スルバシリン静注用1.5g | 1.5g/瓶 |
| 採用 (注) | スルバシリン静注用3g | 3g/瓶 |
| 採用 (注) | ゼビュディ点滴静注液500mg | 500mg8mL/瓶 |
| 採用 (注) | セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」 | 1g/キット(生理食塩液100mL付) |
| 採用 (注) | セファゾリンナトリウム注射用2g「日医工」 | 2g/瓶 |
| 採用 (注) | セファランチン注10mg | 10mg2mL/管 |
| 採用 (注) | セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」 | 1g/瓶 |
| 採用 (注) | セフォタックス注射用1g | 1g/瓶 |
| 採用 (注) | セフォチアム塩酸塩点滴静注用1gバッグ「NP」 | 1g/キット(生理食塩液100mL付) |
| 採用 (注) | セフトアジジム静注用1g「VTRS」 | 1g/瓶 |
| 採用 (注) | セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」 | 1g/瓶 |
| 採用 (注) | セフメタゾールNa静注用1g「NP」 | 1g/瓶 |
| 採用 (注) | セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」 | 1g/キット(生理食塩液100mL付) |
| 採用 (注) | ソセゴン注射液15mg | 15mg1mL/A |
| 採用 (注) | ゾラデックス3.6mgデポ | 3.6mg/筒(ゴセレリンとして) |
| 採用 (注) | ゾラデックスLA10.8mgデポ | 10.8mg/筒(ゴセレリンとして) |
| 採用 (注) | ソリターT2号輸液 | 500mL/袋 |
| 採用 (注) | ソルデム1輸液 | 200mL/袋 |
| 採用 (注) | ソルデム1輸液 | 500mL/袋 |
| 採用 (注) | ソルデム3A輸液 | 200mL/袋 |
| 採用 (注) | ソルデム3A輸液 | 500mL/袋 |
| 採用 (注) | ソルデム6輸液 | 500mL/袋 |
| 採用 (注) | ソルメドロール注125mg | 125mg/瓶(溶解液付) |
| 採用 (注) | ソルメドロール注40mg | 40mg/瓶(溶解液付) |
| 採用 (注) | ソルメドロール注500mg | 500mg/瓶(溶解液付) |
| 採用 (注) | ソララクト輸液 | 500mL/袋 |
| 採用 (注) | ゾレア皮下注150mgペン | 150mg1mL/キット |
| 採用 (注) | ゾレア皮下注300mgペン | 300mg2mL/キット |
| 採用 (注) | ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「トーワ」 | 4mg100mL/袋 |
| 採用 (注) | ダイヤモンド注射用500mg | 500mg/瓶 |
| 採用 (注) | ダウノマイシン静注用20mg | 20mg/瓶 |
| 採用 (注) | タケブロン静注用30mg | 30mg/瓶 |
| 採用 (注) | タゾピベ配合静注用4.5「明治」 | 4.5g/瓶 |
| 採用 (注) | タチオン注射用200mg | 200mg/管 |
| 採用 (注) | ダラキューロ配合皮下注 | 15mL/瓶 |
| 採用 (注) | ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」 | 5,000低分子ヘパリンI.U.(抗第Xa因子活性)20mL/筒 |
| 採用 (注) | ダルベゴエチンアルファ注120 μ gシリンジ「KKF」 | 120 μ g0.5mL/筒 |
| 採用 (注) | ダルベゴエチンアルファ注30 μ gシリンジ「KKF」 | 30 μ g0.5mL/筒 |
| 採用 (注) | ダルベゴエチンアルファ注60 μ gシリンジ「KKF」 | 60 μ g0.5mL/筒 |
| 採用 (注) | ダントリウム静注用20mg | 20mg/瓶 |
| 採用 (注) | チエナム点滴静注用0.5g | 0.5g/瓶 |
| 採用 (注) | デクスメデトミジン静注液200 μ g/50mLシリンジ「ニプロ」 | 200 μ g50mL/筒 |
| 採用 (注) | デスフェラル注射用500mg | 500mg/瓶 |
| 採用 (注) | テセントリク点滴静注1200mg | 1200mg/瓶 |
| 採用 (注) | テタノブリンIH静注1500単位 | 1500I.U.20mL/瓶 |
| 採用 (注) | テタノブリンIH静注250単位 | 250I.U.3.4mL/瓶 |
| 採用 (注) | デトキソール静注液2g | 2g20mL/瓶 |
| 採用 (注) | デノシン点滴静注用500mg | 500mg/瓶 |
| 採用 (注) | デボ・メドロール水懸注40mg | 40mg1mL/瓶 |
| 採用 (注) | デュビクセント皮下注200mgシリンジ | 200mg/1.14mL/筒 |

| | | |
|--------|---------------------------------|--------------------|
| 採用 (注) | デュピクセント皮下注300mgペン | 300mg2mL/キット |
| 採用 (注) | テラルピシン注射用10mg | 10mg/瓶 |
| 採用 (注) | テリバラチドBS皮下注キット600 μ g「モチダ」 | 600 μ g/キット |
| 採用 (注) | ドキシル注20mg | 20mg10mL/瓶 |
| 採用 (注) | ドキシソルピシン塩酸塩注射液10mg「サンド」 | 10mg/瓶 |
| 採用 (注) | ドキシソルピシン塩酸塩注射液50mg「サンド」 | 50mg/瓶 |
| 採用 (注) | ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」 | 20mg1mL/瓶 |
| 採用 (注) | ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」 | 80mg4mL/瓶 |
| 採用 (注) | ドバストン静注50mg | 50mg20mL/管 |
| 採用 (注) | ドバミン塩酸塩点滴静注100mg「KCC」 | 100mg5mL/管 |
| 採用 (注) | ドブタミン塩酸塩点滴静注100mg「サワイ」 | 100mg5mL/管 |
| 採用 (注) | ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KCC」 | 150mg/50mL/筒 |
| 採用 (注) | トブラシン注60mg | 60mg1.5mL/管 |
| 採用 (注) | ドブラム注射液400mg | 400mg20mL/瓶 |
| 採用 (注) | トラスツズマブBS点滴静注用150mg「ファイザー」 | 150mg/瓶 |
| 採用 (注) | トラスツズマブBS点滴静注用60mg「ファイザー」 | 60mg/瓶 |
| 採用 (注) | トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」 | 1000mg10mL/管 |
| 採用 (注) | トルツ皮下注80mgオートインジェクター | 80mg1mL/キット |
| 採用 (注) | ドルミカム注射液10mg | 10mg2mL/管 |
| 採用 (注) | トルリシティ皮下注0.75mgアテオス | 0.75mg0.5mL/キット |
| 採用 (注) | トレアキシン点滴静注100mg/4mL | 100mg4mL/瓶 |
| 採用 (注) | トレシーバ注フレックスタッチ | 300単位/キット |
| 採用 (注) | トレムフィア皮下注100mgシリンジ | 100mg1mL/筒 |
| 採用 (注) | ナファモスタット注射用10mg「SW」 | 10mg/瓶 |
| 採用 (注) | ナファモスタット注射用50mg「SW」 | 50mg/瓶 |
| 採用 (注) | ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」 | 0.2mg1mL/管 |
| 採用 (注) | ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」 | 2mg2mL/管 |
| 採用 (注) | ニコベリック腹膜透析液 | 1.5L1袋 |
| 採用 (注) | ニコベリック腹膜透析液 | 1.5L1袋(排液用バッグ付) |
| 採用 (注) | ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」 | 12mg/瓶 |
| 採用 (注) | ニトプロ持続静注液6mg | 6mg2mL/管 |
| 採用 (注) | ニトロール注5mgシリンジ | 5mg10mL/筒 |
| 採用 (注) | ニトログリセリン注25mg/50mLシリンジ「テルモ」 | 25mg50mL/筒 |
| 採用 (注) | ヌーカラ皮下注100mgペン | 100mg1mL/キット |
| 採用 (注) | ネオアミュー輸液 | 200mL/袋 |
| 採用 (注) | ネオシネジンコーワ注1mg | 1mg1mL/管 |
| 採用 (注) | ネオビタカイン注シリンジ 5 m L | 5mL/筒 |
| 採用 (注) | ネオファーゲン静注20mL | 20mL/管 |
| 採用 (注) | ネオフィリン注250mg | 250mg10mL/管 |
| 採用 (注) | ネスブ注射液120 μ gブラシリンジ | 120 μ g0.5mL/筒 |
| 採用 (注) | ネスブ注射液60 μ gブラシリンジ | 60 μ g0.5mL/筒 |
| 採用 (注) | ノイトロジン注100 μ g | 100 μ g/瓶 |
| 採用 (注) | ノイロトロピン注射液3.6単位 | 3.6単位3mL/管 |
| 採用 (注) | ノーベルパール静注用250mg | 250mg/瓶 |
| 採用 (注) | ノボラピッド30ミックス注フレックスペン | 300単位3mL/筒 |
| 採用 (注) | ノルアドリナリン注1mg | 1mg1mL/管 |
| 採用 (注) | ノルデイトロピンフレックスプロ注10mg | 10mg1.5mL/筒 |
| 採用 (注) | ハイカリックRF輸液500mL | 500mL/袋 |
| 採用 (注) | パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」 | 100mg16.7mL/瓶 |
| 採用 (注) | パクリタキセル注30mg/5mL「NK」 | 30mg5mL/瓶 |
| 採用 (注) | パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」 | 40mg1mL/管 |
| 採用 (注) | パピースモ硝子体内注射液120mg/mL | 0.24mLmg/瓶 |
| 採用 (注) | ハプトグロビン静注2000単位「JB」 | 2,000単位100mL/瓶 |
| 採用 (注) | パム静注500mg | 500mg20mL/管 |
| 採用 (注) | ハラヴェン静注1mg | 1mg2mL/瓶 |
| 採用 (注) | バルクス注10 μ g | 10 μ g2mL/管 |
| 採用 (注) | バルクス注5 μ g | 5 μ g1mL/管 |
| 採用 (注) | バル筋注100mg「AFP」 | 100mg1mL/管 |
| 採用 (注) | パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」 | 0.75mg50mL/袋 |
| 採用 (注) | ハロベリドール注5mg「ヨシトミ」 | 5mg1mL/管 |
| 採用 (注) | バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」 | 0.5g/瓶 |
| 採用 (注) | パントール注射液100mg | 100mg1mL/管 |

| | | |
|--------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 採用 (注) | ハンブ注射用1000 | 1,000 μ g/瓶 |
| 採用 (注) | ヒアルロン酸Na関節注25mg「日新」 | 25mg2.5mL/管 |
| 採用 (注) | ビーフリード輸液 | 500mL/袋 |
| 採用 (注) | ピヴラツ点滴静注液150mg | 150mg6mL/瓶 |
| 採用 (注) | ピクシリン注射用1g | 1g/瓶 |
| 採用 (注) | ピシバニール注射用5KE | 5KE/瓶 |
| 採用 (注) | ピダーザ注射用100mg | 100mg/瓶 |
| 採用 (注) | ピタシミン注射液500mg | 500mg2mL/管 |
| 採用 (注) | ピタメジン静注用 | 瓶 |
| 採用 (注) | ヒベルナ注25mg | 25mg1mL/管 |
| 採用 (注) | ビムバット点滴静注100mg | 100mg10mL/管 |
| 採用 (注) | ヒューマリンR注100単位/mL | 1000単位10mL/瓶 |
| 採用 (注) | ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL | 40mg0.4mL/キット |
| 採用 (注) | ピンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター | 160mg/筒 |
| 採用 (注) | ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」 | 2mL/管 |
| 採用 (注) | ファモチジン注用20mg「トーワ」 | 20mg/管 |
| 採用 (注) | フィコンパ点滴静注用2mg | 2mg/瓶 |
| 採用 (注) | フィジオ140輸液 | 500mL/袋 |
| 採用 (注) | ブイフェンド200mg静注用 | 200mg/瓶 |
| 採用 (注) | フィブリノゲンHT静注用1g「JB」 | 1g/瓶(溶解液付) |
| 採用 (注) | フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「F」 | 75 μ g0.3mL/筒 |
| 採用 (注) | フェインジェクト静注500mg | 500mg/10mL/瓶 |
| 採用 (注) | フェジン静注40mg | 鉄：40mg2mL/管 |
| 採用 (注) | フェスゴ配合皮下注IN | 15mL/瓶 |
| 採用 (注) | フェスゴ配合皮下注MA | 10mL/瓶 |
| 採用 (注) | フェソロデックス筋注250mg | 250mg5mL/筒 |
| 採用 (注) | フェノバル注射液100mg | 100mg1mL/管 |
| 採用 (注) | フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」 | 0.1mg2mL/管 |
| 採用 (注) | ブスコパン注20mg | 20mg1mL/管 |
| 採用 (注) | プラリア皮下注60mgシリンジ | 60mg1mL/筒 |
| 採用 (注) | プリズバインド静注液2.5g | 2.5g50mL/瓶 |
| 採用 (注) | プリンベラン注射液10mg | 10mg2mL/管 |
| 採用 (注) | フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 | 1000mg20mL/瓶 |
| 採用 (注) | フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」 | 0.5mg5mL/筒 |
| 採用 (注) | プレアミン-P注射液 | 200mL/袋 |
| 採用 (注) | プレオ注射用5mg | 5mg/瓶 |
| 採用 (注) | プレセデックス静注液200 μ g/50mLシリンジ「ファイザー」 | 200 μ g50mL/筒 |
| 採用 (注) | プロゲホルモン筋注用25mg | 25mg1mL/管 |
| 採用 (注) | プロジフ静注液200 | 200mg2.5mL/瓶 |
| 採用 (注) | プロスタルモン・F注射液1000 | 1mg1mL/管 |
| 採用 (注) | プロタノールL注0.2mg | 0.2mg1mL/管 |
| 採用 (注) | プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」 | 100mg10mL/瓶 |
| 採用 (注) | プロチレリン酒石酸塩注0.5mg「NP」 | 0.732mg (プロチレリンとして0.5mg) 1mL/管 |
| 採用 (注) | ペイフォータス筋注50mgシリンジ | 50mg0.5mL/本 |
| 採用 (注) | ペイフォータス筋注50mgシリンジ | 100mg1.0mL/本 |
| 採用 (注) | ベクルリー点滴静注用100mg | 100mg/瓶 |
| 採用 (注) | ヘパリンCa皮下注2万単位/0.8mL「サワイ」 | 20,000ヘパリン単位0.8mL/瓶 |
| 採用 (注) | ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」 | 5,000単位5mL/瓶 |
| 採用 (注) | ヘプスプリンIH静注1000単位 | 5mL/瓶 |
| 採用 (注) | ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」 | 100mg4mL/瓶 |
| 採用 (注) | ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」 | 500mg20mL/瓶 |
| 採用 (注) | ペメトレキセド点滴静注液800mg「NK」 | 800mg32mL/瓶 |
| 採用 (注) | ペリナートP静注用500 | 500国際単位/瓶(溶解液付) |
| 採用 (注) | ベルケイド注射用3mg | 3mg/瓶 |
| 採用 (注) | ベルジピン注射液25mg | 25mg25mL/瓶 |
| 採用 (注) | ヘルベッサー注射用10 | 10mg/瓶 |
| 採用 (注) | ホストイン静注750mg | 750mg10mL/瓶 |
| 採用 (注) | ホスホマイシンNa静注用2g「NP」 | 2g/瓶 |
| 採用 (注) | ボスミン注1mg | 1mg1mL/管 |
| 採用 (注) | ボラミン注5mg | 5mg1mL/管 |
| 採用 (注) | ホリゾン注射液10mg | 10mg2mL/管 |
| 採用 (注) | ボルベン輸液6% | 30g500mL/袋 |

| | | |
|--------|----------------------------------|----------------------------|
| 採用 (注) | ボンベンディ 静注用1300 | 1300IU/瓶 |
| 採用 (注) | マキサカルシトール 静注透析用5 μ g「トーフ」 | 5 μ g1mL/管 |
| 採用 (注) | マグセント注100mL | 100mL/瓶 |
| 採用 (注) | マンジャロ皮下注2.5mgアテオス | 2.5mg0.5mL/キット |
| 採用 (注) | マンニトールS注射液 | 300mL/袋 |
| 採用 (注) | ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」 | 50mg/瓶 |
| 採用 (注) | ミチーガ皮下注用30mgバイアル | 30mg/瓶 |
| 採用 (注) | ミチーガ皮下注用60mgシリンジ | 60mg/筒 |
| 採用 (注) | ミッドペリックL135腹膜透析液 | 1.5L1袋(排液用バッグ付) |
| 採用 (注) | ミッドペリックL250腹膜透析液 | 1.5L1袋(排液用バッグ付) |
| 採用 (注) | ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」 | 100mg/瓶 |
| 採用 (注) | ミラクリッド注射液5万単位 | 50,000単位1mL/管 |
| 採用 (注) | ミルセラ注シリンジ150 μ g | 150 μ g0.3mL/筒 |
| 採用 (注) | ミルセラ注シリンジ75 μ g | 75 μ g0.3mL/筒 |
| 採用 (注) | ミルリノン注10mg「タカタ」 | 10mg10mL/管 |
| 採用 (注) | メイロン静注8.4% | 1.68g20mL/管, 21g250mL/袋 |
| 採用 (注) | メコバラミン注500 μ g「NP」 | 500 μ g1mL/管 |
| 採用 (注) | メソトレキセート点滴静注液1000mg | 1000mg40mL/瓶 |
| 採用 (注) | メソトレキセート点滴静注液200mg | 200mg8mL/瓶 |
| 採用 (注) | メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」 | 0.2mg1mL/管 |
| 採用 (注) | メロベネム点滴静注用0.5g「明治」 | 500mg/瓶 |
| 採用 (注) | メロベネム点滴静注用1g「明治」 | 1g/瓶 |
| 採用 (注) | モノヴァー 静注1000mg | 1000mg10mL/瓶 |
| 採用 (注) | モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」 | 10mg1mL/管 |
| 採用 (注) | モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」 | 50mg5mL/管 |
| 採用 (注) | ライゾデグ配合注フレックスタッチ | 300単位/キット |
| 採用 (注) | ラクトリンゲルM注「フソー」 | 500mL/袋 |
| 採用 (注) | ラシックス注20mg | 20mg2mL/管 |
| 採用 (注) | ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」 | 0.5mg0.05mL/筒 |
| 採用 (注) | ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg | 300mg60mL/袋(ペラミビルとして) |
| 採用 (注) | ランマーク皮下注120mg | 120mg1.7mL/瓶 |
| 採用 (注) | リクラスト点滴静注液5mg | 5mg100mL/瓶 |
| 採用 (注) | リクラスト点滴静注液5mg | 5mg100mL/袋 |
| 採用 (注) | リコモジュリン点滴静注用12800 | 12800単位/瓶 |
| 採用 (注) | リスモダンP静注50mg | 50mg5mL/管 |
| 採用 (注) | リツキサン点滴静注100mg | 100mg10mL/瓶 |
| 採用 (注) | リツキサン点滴静注500mg | 500mg50mL/瓶 |
| 採用 (注) | リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」 | 100mg10mL/瓶 |
| 採用 (注) | リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」 | 500mg50mL/瓶 |
| 採用 (注) | リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」 | 100mg5mL/筒 |
| 採用 (注) | リドカイン点滴静注液1%「タカタ」 | 2000mg200mL/袋 |
| 採用 (注) | リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」 | 50mg5mL/A |
| 採用 (注) | リノロサル注射液4mg (0.4%) | 4mg1mL/管 |
| 採用 (注) | リメタゾン静注2.5mg | 4mg1mL/管 (デキサメタゾンとして2.5mg) |
| 採用 (注) | リュープリンPRO注射用キット22.5mg | 22.5mg/キット |
| 採用 (注) | リュープリンSR注射用キット11.25mg | 11.25mg/筒 |
| 採用 (注) | リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」 | 3.75mg/筒 |
| 採用 (注) | リンデロン懸濁注 | 2.5mg0.5mL/管 |
| 採用 (注) | リン酸Na補正液0.5mmol/mL | 20mL/管 |
| 採用 (注) | レギュニールLCa1.5腹膜透析液 | UVツインバッグ1.5L1袋(排液用バッグ付) |
| 採用 (注) | レギュニールLCa1.5腹膜透析液 | シングルバッグ・機器専用2.5L1袋 |
| 採用 (注) | レギュニールLCa1.5腹膜透析液 | シングルバッグ・機器専用5.0L1袋 |
| 採用 (注) | レギュニールLCa2.5腹膜透析液 | UVツインバッグ1.5L1袋(排液用バッグ付) |
| 採用 (注) | レベタン注0.2mg | 0.2mg1mL/管 |
| 採用 (注) | レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「ニプロ」 | 100mg5mL/筒 |
| 採用 (注) | レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」 | 500mg100mL/袋 |
| 採用 (注) | レボホリナート点滴静注用100mg「トーフ」 | 100mg/瓶(レボホリナートとして) |
| 採用 (注) | レボホリナート点滴静注用25mg「トーフ」 | 25mg/瓶(レボホリナートとして) |
| 採用 (注) | レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」 | 2mg/瓶 |
| 採用 (注) | ロイコポリン注3mg | 3mg1mL/管 |
| 採用 (注) | ロイナーゼ注用5000 | 5,000K.U./瓶 |
| 採用 (注) | ロゼウス静注液40mg | 40mg4mL/瓶 |

| | | |
|--------|------------------------------|------------------------------|
| 採用 (注) | ロナブリーブ注射液セット1332 | 各1332mg11.1mL/瓶 |
| 採用 (注) | ロナブリーブ注射液セット300 | 各300mg2.5mL/瓶 |
| 採用 (注) | ロピオン静注50mg | 50mg5mL/管 |
| 採用 (注) | ワゴスチグミン注0.5mg | 0.5mg1mL/管 |
| 採用 (注) | ワソラン静注5mg | 5mg2mL/管 |
| 採用 (注) | エフェドリン「ナガキ」注射液40mg | 40mg1mL/管 |
| 採用 (注) | 亜硝酸アミル「AFP」 | 0.25mL/管 |
| 採用 (注) | 塩化Na補正液2.5mEq/mL | 2.922g(2.5mol/L)20mL/管 |
| 採用 (注) | 乾燥HBグロブリン筋注用1000単位「ニチャク」 | 1,000単位/瓶(溶解液5mL付) |
| 採用 (注) | 乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチャク」 | 200単位/瓶(溶解液1mL付) |
| 採用 (注) | 献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「KMB」 | 12.5g50mL/瓶 |
| 採用 (注) | 献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」 | 12.5g250mL/瓶 |
| 採用 (注) | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL | 5g50mL/瓶 |
| 採用 (注) | 献血ベニロン-I静注用2500mg | 2.5g/瓶(溶解液付) |
| 採用 (注) | 抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」 | 1,000倍/瓶(溶解液付) |
| 採用 (注) | 抗HBs人免疫グロブリン筋注1000単位/5mL「JB」 | 5mL/瓶 |
| 採用 (注) | 抗HBs人免疫グロブリン筋注200単位/1mL「JB」 | 1mL/瓶 |
| 採用 (注) | 水溶性ヒドロコト注射液100mg | 100mg2mL/瓶 |
| 採用 (注) | 水溶性プレドニン10mg | 10mg/管 |
| 採用 (注) | 水溶性プレドニン50mg | 50mg/管 |
| 採用 (注) | 生食注シリンジ「NP」 | 90mg・10mL/筒 |
| 採用 (注) | 静注用マグネズール20mL | 20mL/管 |
| 採用 (注) | 大塚蒸留水 | 20mL/管 |
| 採用 (注) | 大塚蒸留水 | 100mL/本 |
| 採用 (注) | 大塚生食注 | 20mL/管 |
| 採用 (注) | 大塚生食注 | 50mL/本 |
| 採用 (注) | 大塚生食注 | 100mL/本 |
| 採用 (注) | 大塚生食注 | 250mL/袋 |
| 採用 (注) | 大塚生食注 | 500mL/袋 |
| 採用 (注) | 大塚生食注2ポート100mL | 100mL/本 |
| 採用 (注) | 大塚糖液10% | 20mL/管 (ブドウ糖2g : 8kcal) |
| 採用 (注) | 大塚糖液5% | 20mL/管 (ブドウ糖1g : 4kcal) |
| 採用 (注) | 大塚糖液5% | 50mL/本 (ブドウ糖2.5g : 10kcal) |
| 採用 (注) | 大塚糖液5% | 100mL/本 (ブドウ糖5g : 20kcal) |
| 採用 (注) | 大塚糖液5% | 250mL/袋 (ブドウ糖12.5g : 50kcal) |
| 採用 (注) | 大塚糖液5% | 500mL/袋 (ブドウ糖25g : 100kcal) |
| 採用 (注) | 大塚糖液50% | 20mL/管 (ブドウ糖10g : 40kcal) |
| 採用 (注) | 大塚糖液50% | 200mL/袋 (ブドウ糖100g : 400kcal) |
| 採用 (注) | 注射用イホマイド1g | 1g/瓶 |
| 採用 (注) | 注射用エンドキサン500mg | 500mg/瓶 |
| 採用 (注) | 注射用フィルデシン1mg | 1mg/瓶 |
| 採用 (注) | 注射用メソトレキセート50mg | 50mg/瓶 |
| 採用 (注) | 注射用メソトレキセート5mg | 5mg/瓶 |
| 採用 (注) | 低分子デキストランL注250mL1袋 | 250mL/袋 |
| 採用 (注) | 硫酸Mg補正液1mEq/mL | 2.46g20mL/管(0.5mol/L) |
| 処置 | 1%ディプリバン注-キット | 500mg50mL/筒 |
| 処置 | 10%ハイポアルコール | 10%500mL/本 |
| 処置 | DTピック | 0.1mL/瓶 |
| 処置 | Dドライ透析剤3.0S | A剤 : 2682.0g・B剤 : 661.6g |
| 処置 | EOB・プリモビスト注シリンジ | 1814.30mg10mL/筒 |
| 処置 | LH-RH注0.1mg「ニプロ」 | 0.1mg1mL/管 |
| 処置 | N-マルチスティックスSG-L | 100枚/缶 |
| 処置 | TRH注0.5mg「ニプロ」 | 0.5mg1mL/管 |
| 処置 | アイオピジンUD点眼液1% | 0.1mL/本 |
| 処置 | アクトヒブ | 瓶 (溶解液付) |
| 処置 | アデノスキャン注60mg | 60mg20mL/瓶 |
| 処置 | アナベイン注7.5mg/mL | (7.5mg/mL) 20mL/管 |
| 処置 | アブリスゴ筋注用 | 瓶 (溶解液付) |
| 処置 | アルギニン点滴静注30g「AY」 | 30g300mL/袋 |
| 処置 | アレックスビー筋注用 | 120μg0.5mL/本 |
| 処置 | アロンアルファA「三共」 | 0.5g/管 |
| 処置 | イオバミドール370注100mL「F」 | 75.52%100mL/筒(l : 370mg/mL) |

| | | |
|----|------------------------------------|----------------------------|
| 処置 | イオバミドール370注シリンジ100mL「F」 | 75.52%100mL/筒(I: 370mg/mL) |
| 処置 | イオバミロン注300 | 12.25g20mL/瓶(I: 300mg/mL) |
| 処置 | イオバミロン注300 | 30.62g50mL/瓶(I: 300mg/mL) |
| 処置 | イオバミロン注300 | 61.24g100mL/瓶(I: 300mg/mL) |
| 処置 | イオバミロン注370シリンジ | 75.52g100mL/筒(I: 370mg/mL) |
| 処置 | イオメロン350注シリンジ135mL | 71.44%135mL/筒(I: 350mg/mL) |
| 処置 | イオメロン350注シリンジ75mL | 71.44%75mL/筒(I: 350mg/mL) |
| 処置 | イソジンゲル10% | 90g/本 |
| 処置 | イソゾール注射用0.5g | 500mg/瓶(溶解液付) |
| 処置 | イソピスト注240 10mL | 10mL/瓶 |
| 処置 | イモバックスポリオ皮下注 | 0.5mL/筒 |
| 処置 | インジゴカルミン注20mg「AFP」 | 20mg5mL/管 |
| 処置 | インフルエンザHAワクチン「第一三共」 | 1mL/瓶 |
| 処置 | ウログラフィン注60% | 60%20mL/管(I: 292mg/mL) |
| 処置 | ウログラフィン注60% | 60%100mL/瓶(I: 292mg/mL) |
| 処置 | ウロマチックS泌尿器科用灌流液3% | 90g3L/袋 |
| 処置 | ウロラプスティックス | 100枚/缶 |
| 処置 | エスクレ注腸用キット「500」 | 500mg/キット |
| 処置 | エタノールシオエ | (95.1~96.9vol%) 500mL/瓶 |
| 処置 | エトキシスクレロール1%注射液 | 0.3g30mL/瓶 |
| 処置 | エネマスター注腸散 | 98.1%400g/袋 |
| 処置 | エムニケーター | 30本/キット |
| 処置 | オキシドールシオエ | (2.5~3.5w/v%) 500mL/瓶 |
| 処置 | オフサグリーン静注用25mg | 25mg/瓶(溶解液付) |
| 処置 | オブチレイ350注シリンジ100mL | 100mL/筒 |
| 処置 | オムニパーク240注10mL | 5.177g10mL/瓶(I: 240mg/mL) |
| 処置 | オムニパーク300注シリンジ100mL | 64.71g100mL/筒(I: 300mg/mL) |
| 処置 | オムニパーク350注100mL | 75.49g100mL/瓶(I: 350mg/mL) |
| 処置 | オリブ油「ヨシダ」 | (滅菌済) 60mL |
| 処置 | オリブ油「ヨシダ」 | (滅菌済) 5mL |
| 処置 | オリブ油シオエ | 500mL |
| 処置 | オルダミン注射用1g | 1g10g/瓶 |
| 処置 | カーボスター透析剤・L | A液6L・B液7.6L |
| 処置 | ガストログラフィン経口・注腸用 | 100mL/瓶(I: 370mg/mL) |
| 処置 | ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL | 60.47%7.5mL/筒 |
| 処置 | キシロカインゼリー2% | (20mg/mL) 30mL/本 |
| 処置 | キシロカインビスカス2% | (20mg/mL) 100mL/瓶 |
| 処置 | キシロカインポンプスプレー8% | (80mg/mL) 80g/瓶 |
| 処置 | キシロカイン液「4%」 | (40mg/mL) 100mL/瓶 |
| 処置 | キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有 | 100mg20mL/瓶 |
| 処置 | キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有 | 200mg20mL/瓶 |
| 処置 | キシロカイン点眼液4% | (40mg/mL) 20mL/瓶 |
| 処置 | クアトロバック皮下注シリンジ | 0.5mL/筒 |
| 処置 | クリアビュー EASY HCG | 20テスト用 |
| 処置 | グリセリンシオエ | 500mL/瓶 |
| 処置 | グリセリン洗腸液50%「ケンエー」120mL | 120mL/個 |
| 処置 | グリセリン洗腸液50%「ケンエー」40mL | 40mL/個 |
| 処置 | グリセリン洗腸液50%「ケンエー」60mL | 60mL/個 |
| 処置 | グルカゴンGノボ注射用1mg | 1mg/瓶(溶解液付) |
| 処置 | グルテストNeoセンサー | 30枚/箱 |
| 処置 | ゴービック水性懸濁注シリンジ | 0.5mL/本 |
| 処置 | コミナティ筋注シリンジ12歳以上用 | 0.3mL/本 |
| 処置 | サーファクテン気管注入用120mg | 120mg/瓶 |
| 処置 | サブバック血液ろ過用補充液-Bi | 2020mL/袋 |
| 処置 | ザルコニン液0.05 | 0.05%1L/本 |
| 処置 | ザルコニン液10 | 10w/v%500mL/本 |
| 処置 | ジアグノグリーン注射用25mg | 25mg/瓶(溶解液付) |
| 処置 | ジェービックV | 0.5mL/瓶 |
| 処置 | シェルガン0.5眼粘弾剤 | 0.5mL/筒 |
| 処置 | ジメチコン内用液2%「ホリイ」 | 300mL/瓶 |
| 処置 | シルガード9水性懸濁筋注シリンジ | 0.5mL/筒 |
| 処置 | シングリックス筋注用 | 50µg/0.5mL/瓶 |

| | | |
|----|---------------------------------|---------------------------------|
| 処置 | スーブレン吸入麻酔液 | 240mL/本 |
| 処置 | スコピゾル眼科用液 | 15mL/本 |
| 処置 | ステリクロンW液0.5 | 500mL/本 |
| 処置 | スポンゼル | 5cm×2.5cm/枚 |
| 処置 | セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 | 250mL/瓶 |
| 処置 | ソナゾイド注射用16μL | 16μL/瓶(溶解液付) |
| 処置 | ソフラチュール貼付剤10cm | (10.8mg)10cm×10cm/枚 |
| 処置 | タコシール組織接着用シート | 9.5cm×4.8cm/枚 |
| 処置 | テキサント消毒液6% | (6w/v%) 500g/本 |
| 処置 | トレーランG液50g | 50g150mL/瓶(ブドウ糖として) |
| 処置 | トレーランG液75g | 75g225mL/瓶(ブドウ糖として) |
| 処置 | ドロレプタン注射液25mg | 25mg10mL/瓶 |
| 処置 | トロンピン液モチダソフトボトル1万 | 10,000単位10mL/キット |
| 処置 | ニフレック配合内用剤 | 137.155g/袋 |
| 処置 | ニューモバックスNPシリンジ | 0.5mL/筒 |
| 処置 | ハードファットS-55「マルイシ」 | 500g/個 |
| 処置 | ハイジール消毒用液10% | 10%500mL/本 |
| 処置 | バクニュバンス水性懸濁注シリンジ | 0.5mL/本 |
| 処置 | ハッカ水「ケンエー」 | 500mL/本 |
| 処置 | ハッカ油「コザカイ・M」 | 20mL/瓶 |
| 処置 | パッチテストパネル(S) | 2枚/組 |
| 処置 | バリコンミール | 99%400g/本 |
| 処置 | バロス発泡顆粒-S | 5g/本 |
| 処置 | ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1%「生化学」 | 6mg0.6mL/筒 |
| 処置 | ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」 | 8.5mg0.85mL/筒 |
| 処置 | ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184% | (4.6mg/mL) 20mL/瓶(希釈液480mLボトル付) |
| 処置 | ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184% | (4.6mg/mL) 20mL/瓶(希釈液480mLバッグ付) |
| 処置 | ビームゲン注0.25mL | 5μg0.25mL/瓶 |
| 処置 | ビームゲン注0.5mL | 10μg0.5mL/瓶 |
| 処置 | ヒトCRH静注用100μg「ニプロ」 | 100μg/瓶(溶解液付) |
| 処置 | ピトレシン注射液20 | 20単位1mL/管 |
| 処置 | ピュアラビング | 83%250mL |
| 処置 | ピリスコピン点滴静注50 | 100mL/瓶(I:50mg/mL) |
| 処置 | フタラール消毒液0.55%「ケンエー」 | 0.55%5L/本 |
| 処置 | フルービックHAシリンジ | 0.5mL/筒 |
| 処置 | フルオレサイト静注500mg | 500mg5mL/瓶 |
| 処置 | プレベナー20水性懸濁注 | 0.5mL/筒 |
| 処置 | プロウベス腔用剤10mg | 10mg/個 |
| 処置 | フローレス眼検査用試験紙0.7mg | 0.7mg/枚 |
| 処置 | プロナーゼMS | 20000単位0.5g/包 |
| 処置 | プロハンス静注シリンジ13mL | 3630.90mg13mL/筒 |
| 処置 | プロビレングリコール | mL |
| 処置 | プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」 | 200mg20mL/管 |
| 処置 | ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ10mL | 1,000単位10mL/筒 |
| 処置 | ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「フソー」 | 5,000ヘパリン単位20mL/筒 |
| 処置 | ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」 | 5,000単位0.2mL/筒 |
| 処置 | ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.25mL | 0.25mL/筒 |
| 処置 | ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL | 0.5mL/筒 |
| 処置 | ベリプラストPコンビセット組織接着用 | 1mL2キット1組 |
| 処置 | ボースデル内用液10 | 10mg250mL/袋(マンガンとして) |
| 処置 | ボスミン外用液0.1% | (1mg/mL) 100mL/瓶 |
| 処置 | ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」 | 7.5%500mL/本(75mg/mL) |
| 処置 | ポビドンヨードフィールド外用液10%「明治」 | 10%250mL/本(100mg/mL) |
| 処置 | ポビドンヨード外用液10%「明治」 | 10%250mL/本(100mg/mL) |
| 処置 | ポプスカイン0.75%注150mg/20mL | 150mg20mL/管 |
| 処置 | ボルヒール組織接着用1mL | 1mL4瓶1組 |
| 処置 | ボルヒール組織接着用3mL | 3mL4瓶1組 |
| 処置 | ボルヒール組織接着用5mL | 5mL/4瓶1組 |
| 処置 | マーカイン注脊麻用0.5%高比重 | 20mg4mL/管 |
| 処置 | マーカイン注脊麻用0.5%等比重 | 20mg4mL/管 |
| 処置 | マイクロシールドスクラブ液4% | 4%500mL/本 |
| 処置 | マキューイド眼注用40mg | 40mg/瓶 |

| | | |
|----|--------------------------|--------------------------------|
| 処置 | マグコロール散68%分包100g | 68g100g/包 |
| 処置 | マグコロール散68%分包50g | 34g50g/包 |
| 処置 | マグネスコープ静注38%シリンジ15mL | 5.65g15mL/筒 (37.695%) |
| 処置 | メディセーフフィットチップ | 30個/箱 |
| 処置 | ユービット錠100mg | 100mg/錠 |
| 処置 | リティンパ耳科用250 μ gセット | 250 μ g/セット |
| 処置 | リドカインテープ18mg「YP」 | (18mg)30.5mm \times 50.0mm/枚 |
| 処置 | リドカイン塩酸塩ゼリー2%「日新」 | 100mL/瓶 |
| 処置 | リドカイン塩酸塩注射液0.5%「VTRS」 | 25mg5mL/管 |
| 処置 | リドカイン塩酸塩注射液1%「VTRS」 | 100mg10mL/管 |
| 処置 | リドカイン塩酸塩注射液2%「VTRS」 | 200mg10mL/管 |
| 処置 | リピオドール480注10mL | 10mL/管(I : 480mg/mL) |
| 処置 | ロタリックス内用液 | 1.5mL/本 |
| 処置 | 一般診断用精製ツベルクリン (PPD) 1人用 | 0.25 μ g/瓶(溶解液付) |
| 処置 | 塩酸メピバカイン注シリンジ0.5%「NP」 | 10mL/筒 |
| 処置 | 乾燥BCGワクチン (経皮用・1人用) | 12mg/管 |
| 処置 | 乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」 | 各6,000単位入/瓶(溶解液付) |
| 処置 | 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」 | 瓶(溶解液付) |
| 処置 | 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 | 瓶(溶解液付) |
| 処置 | 乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」 | 瓶(溶解液付) |
| 処置 | 乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」 | 瓶(溶解液付) |
| 処置 | 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」 | 0.5mL/瓶(溶解液付) |
| 処置 | 逆性石ケン液0.025「ヨシダ」 | 0.025w/v%500mL/本 |
| 処置 | 血沈用チトラート「ハラサワ」液 | 3.8%/管 (0.5mL) |
| 処置 | 酸化亜鉛「ケンエー」 | 500g/箱 |
| 処置 | 消毒用エタノール液IP | (76.9~81.4vol%) 500mL/瓶 |
| 処置 | 生食注シリンジ「オーツカ」 | 45mg \cdot 5mL/筒 |
| 処置 | 生理食塩液「ヒカリ」 | 1L/本 (広口開栓型) |
| 処置 | 生理食塩液PL「フソー」 | 2L/バッグ |
| 処置 | 生理食塩液バッグ「フソー」 | 1L/袋 (ALタイプ) |
| 処置 | 大塚蒸留水 | 500mL/本 |
| 処置 | 大塚生食注 | 500mL/本 (細口開栓) |
| 処置 | 中性緩衝ホルマリン水20 | (35.0~38.0%100mL) 500mL/本 |
| 処置 | 注射用GHRP 科研100 | 100 μ g/瓶(溶解液付) |
| 処置 | 注射用水 | 1L/本 |
| 処置 | 沈降破傷風トキシイド「生研」 | 0.5mL/瓶 |
| 処置 | 無水エタノールシオエ | (99.5vol%以上) 500mL/瓶 |
| 処置 | 無水エタノール注「フソー」 | 5mL/管 |
| 処置 | 薬用炭「日医工」 | 未 |