



# Clostridioides (Clostridium) difficile 治療 院内フォーミュラリ

監修 感染防止対策委員会  
2021.3作成 薬剤部 堀 勇太  
2022.8改訂 薬剤部 森 良江、前 万紀子  
2023.8改訂 薬剤部 田中 伽歩  
2024.4 薬価改訂

※ ( ) 内は1日薬価 2024.4時点

※薬剤選択に難渋する場合、再発、難治例の場合は適宜AST（抗菌薬適正使用支援チーム）へコンサルトをする

<p>★重症度定義は下記の1つ以上に合致するものとする。(IDSA/SHEA)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・イレウス</li><li>・低血圧など血行状態不安定</li><li>・ショック</li><li>・WBC <math>\geq 15000/\mu\text{L}</math></li><li>・血清クレアチニン <math>\geq 1.5 \times</math> 基準値</li><li>・巨大結腸/大腸膨満</li></ul>	<p>◎再発のリスク因子(IDSA/SHEA)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・高齢(65歳以上)</li><li>・CDIの既往</li><li>・重症CDI</li><li>・免疫不全宿主(免疫抑制剤の使用など)</li><li>・強毒株による感染(RT 027/078/244)</li></ul>
--	---



### 1) バンコマイシン パルス・漸減療法

- ① 1回125mg 1日4回10~14日間→1回125mg 1日2回1週間→1回125mg 1日1回1週間→1回125mg 2~3日に1回2~8週間
- ② 1回125mg 1日4回1週間→1回125mg 1日3回1週間→1回125mg 1日2回1週間→1回125mg 1日1回1週間→1回125mg 2日に1回1週間→1回125mg 3日に1回1週間

- 【治療の基本】
- ・無症候性のキャリアは治療適応とならない
  - ・使用中の抗菌薬は可能であれば中止する
  - ・治療期間は通常10日間。治療への反応が乏しい患者では、14日間投与を考慮
  - ・症状改善を治療終了の指標とし、効果判定目的でCDトキシンの再検を行わない